T T
M
6

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

REHFELDT, A.

65726/A

T7

HODEGUS BOTANICUS MENSTRUUS,

PRÆMISIS RUDIMENTIS BOTANICIS,

PLANTAS,

Quæ potiſſimum circa Halam Saxonum, vel ſponte proveniunt vel ſtudioſe nutriuntur, non ſolum uſitatioribus nominibus enumerans; Sed &, quo loco eædem inveniantur, & quo tempore juxta ſeriem Menſium floreant, indigitans, Plantis officinalibus peculiariter notatis.

In Botanophilorum gratiam conſignatus

AB

ABRAHAMO Rehfeldt/

Med. Candidat.

HALÆ MAGDEBURGICÆ,
Sumptibus ORPHANOTROPHEI.
ANNO MDCCXVII.

MEDICAL SOCIETY OF LONDON 90

LECTORI BENEVOLO.

QUem Tibi, Lector benevole, aliquorum petitis conſignatum, Plantarum circa Halam Saxonum maxime vel ſponte,vel cultura in Horto Orphanotrophei vel aliis cultioribus provenientium, Catalogum exhibeo, præmiſſisRudimentisBotanicis,ita digerere animus fuit, vt prima quaſi fronte tempus, quo, & locus, quorſum ad Plantas colligendas prodeundum ſit, innoteſceret: ita, ut non ſolum hujus, ſed aliorum locorum Botanophilis Hodegum ſeſe exhibere poſſit. Plantæ vero uſitatioribus ſaltem nominibus denominatæ ſunt, reliquis, quæ vel falſa vel obſoleta viſa ſunt, utpote confuſionem potius paritura, omiſſis. Interim ſi & hic error aliquis irrepſerit, vel ſi tempeſtatis vicisſitudo Plantæ proventum & florem vel anteverterit vel poſtpoſuerit, facile illum, ut ſpero, Lector benevolus pro humanitate ſua excuſabit. Coeterum officinales, majuſculis literis expreſſæ & quæ partes earundem officinis Pharmacevticis in uſu eſſe covſueverunt, ſimul indigitatæ ſunt. Quibus, ſi voles, fruere & vale.

BOtanica a primis ævis quidem cultá, ſed non condigne ex culta, multas difficultates in cognoſcendis & diſcernendis plantis poſteris peperit. Oritur autem illa difficultas ex duplici fonte 1.) ex incongrua Nominum impoſitione. 2.) ex inconcinna Plantarum diſpoſitione & ordine.

Primum quod attinet, non negandum quidem eſt, primis hujus ſcientiæ ſtatoribus licitum fuiſſe, plantas quocunque voluerint nomine inſignire, cum Nomina rem ipſam exprimentia non ſemper ſuppetant; qua libertate etiam uſi, Plantas aliquas a primis inventoribus, alias a Patria, alias quocunque alio nomine appellarunt; Sed quod has non pari conſtantia omnes ita denominaverint, factum exinde eſt, quod poſteri non intellexerint, qualem plantam primus Autor ſub inpoſito nomine deſcripſerit, itaque novis quisque pro ſuo genio ornavit titulis, ex quo coacervata ſunt Nomina, & obſcura facta ſunt omnia, ita, ut hodienum ſub judicelis ſit, quodnam verum ſit Alyſſum Galeni, quid verus Calamus aromaticus veterum, quæ vera Herba Coſtæ.

Orta autem potiſſimum confuſio hæc ſecundo ex inconcinna Plantarum diſpoſitione & ordine, idque ex defectu ſatis firmi & adæquati

adæquati fundamenti factum eſt. Cum enim veteres neglectis eſſentialibus ad accidentales Plantarum partes variantes; ad folia, radices, odorem, ſaporem & vires in denominandis & ordinandis plantis reſpexerint, non potuit non fieri, quin conjungenda ſecreverint, & ſecernenda conjunxerint. Sic incongrue Cardamindum propter ſaporem Naſturtii ad Naſturtiorum, Moldavica propter odorem Meliſſæ, ad Meliſſæ genera referuntur.

His igitur difficultatibus conſulturi Neoterici, ductum Naturæ ſecuti de methodo univerſali, clara, diſtincta & firma cogitare cœperunt, nec infelici ſucceſſu. Siquidem cum, quando veteres plantam aliquam á radice usque ad ſummitates & flores multis verbis deſcribunt, vix tamen, quale Plantæ genus intelligant, innoteſcat; felicius recentioris ævi Botanici paucioribus id omne expediunt.

Quo fundamento vero illi nitantur, paucis jam indigitabimus.

Cum Botanica ſit ſcientia Plantas & earum partes probe cognoſcendi & a ſe invicem diſcernendi, in determinandis Plantarum nominibus Convenientia & Diſconvenientia maxime reſpicienda eſt. Hinc Regula naſcitur generalis. *Quæ conveniunt, eodem, quæ non conveniunt, diverſo nomine ſunt appellandæ.*

 In

In quo vero primario convenire debeant, ſi ad idem genus referri mereantur, nunc diſpiciendum eſt. Nos ſepoſitis etiam Neotericorum diſſenſionibus Florum & Fructuum convenientiam & differentiam hic maxime attendendam eſſe cenſemus. Ex qua duæ Regulæ iterum promanant, ſcilicet:

I. Quæcunque Planta ad eundem modum floret & fructus fert, illa ad idem genus pertinet, & eodem nomine appellanda.

II. Quæcunque Planta non ad eundem modum floret, nec fructus producit, illa ad aliud genus referenda, alioque nomine inſignienda eſt.

Scilicet conſiderandus primo Flos, deinde Fructus. Flos enim Natura prior eſt, quam Fructus, & quoniam cum floribus rudimenta fructuum conſpicere integrum eſt; ſatius eſt, eos prius & cum rudimentis contemplari, quam perfectis Fructibus ſine Floribus.

Quemadmodum autem ad Definitionem Plantæ, ſub quo nomine & Arbores, Frutices & Suffrutices complectimur, tria requiruntur, ſcilicet 1) *genus ſummum* 2) *genus ſubalternum ſeu proximum.* 3) *differentia ſpecifica*; ita de Primo nobis primum erit ſermo:

I. Ex Flore enim addiſcimus *genus ſummum* ſeu videmus, ad quem ordinem planta pertineat.

neat. In inveniendo autē hoc ſummo genere conſiderandum eſt (1) *an planta flore plane deſtituta ſit*, & tunc ad claſſem Plantarum flore carentium pertinebit, (2) qualis ſit flos, an *perfectus* vel *imperfectus*. Si *imperfectus*, ſeu, qui caret petalo, pertinebit vel 1) ad claſſem *amentiferorum* v. g. Betulæ, Coryli, populi. vel 2) *ſtamineo flore* præditorum, ut ſunt Frumenta, gramina vel 3) *floſculis conglomeratis* donatorum v. g. Botryos, Atriplicis, vel 4) *dorſiferorum* v. g. Polypodii, Murariæ, Filicis &c.

Si *perfectus* flos in Planta conſpiciatur, ſcilicet talis, qui primario petalis, ſecundario ſtylo & ſtaminibus gaudeat, diſpiciendum eſt, an ſit 1) *regularis ſeu uniformis an* 2) *irregularis ſeu difformis*. *Regularis* flos dicitur quando, ſi ex floris centro circulus circumſcribatur, harmonice omnia conſpirent. Irregularis, qui a regulari forma plus minus declinat. Quanquam dentur flores, quorum Petala inter ſe ratione latitudinis aut longitudinis differunt, non tamen ex regularium numero excludendi, ſi modo alternatim ſibi reſpondeant v. g. in Levcojo bulboſo triphyllo tria majora & tria minora alternatim ſibi ſunt conuenientia.

Regularis autem Floris ſeptem numerantur Claſſes: Alius enim Flos eſt 1) *Monopetalus*, qui unum 2) *Dipetalus*, qui duo, 3)

Tripetalus, qui tria, 4) *Tetrapetalus*, qui quatuor, 5) *Pentapetalus*, qui quinque, 6) *Hexapetalus*, qui ſex, 7) *Polypetalus*. qui plures, quam ſex Petala poſſidet. Tot enim numerantur Petala, in quot ſua ſponte Flos reſolvitur. Notandum tamen, reperiri flores, qui nunquam decidunt, ſed cum fructu exareſcunt. De his ſequentes notentur Regulæ:

I. *Quicunque Flores ſupra Fructum hærent, fundo integro, Monopetali ſunt* v. g. Ribes.

II. *Qui in ſinu ſuo fructum ferunt petaliſque laxius cohærentibns conſtant, pro petalis diverſis habendi ſunt*: v. g. pro Tetrapetalo Chryſoſplenium, pro Polypetalo, Sempervivum majus.

Cavendum porro eſt, ne Laciniæ confundantur cum Petalis; videlicet reperiuntur flores, quæ profunde laciniatæ ſunt, adeoque facile non advertentem fallunt v. g. Malva, Althæa, Nummularia, ſi fugitivo oculo intueamur, videntur pluribus petalis conſtare; ſi vero fundus accuratius inſpiciatur, deprehenditur ille integer, cum quo laciniæ firmius cohærent, adeoque uno ſaltem petalo inquinque lacinias diviſo gaudere.

Quot vero Claſſes ſunt Regularium, tot etiam dantur *Irregularium*. Siquidem itidem ſunt vel; 1) *Monopetali* 2) *Dipetali* 3) *Tripe-*

Tripetali 4) *Tetrapetali* 5) *Pentapetali* 6) *Hexapetali.* 7) *Polypetali.* Anomalia vero conſiſtit in eo, quod Laciniæ ſitu & figura inter ſe differant.

Irregularium vero numerum augent plurimum ex Monopetalis verticillatæ, ſeu quorum floſculi articulos caulis ambiunt. Plures enim inter Monopetalos irregulares ſpectantur differentiæ, alius enim flos eſt *barbatus tantum* v. g. Scordii, Chamæpytios; vel *galeatus & barbatus* ſimul v. g. Galeopſis, Lamii. Galea & barba autem eſt vel *integra* vel *diviſa*, unde ſunt, qui galea vel barba tri-aut quadri partita gaudent. Huc ſpectant etiam Flores *fiſtulares* & *ſemifiſtulares* v. g Ariſtolochiæ, *corniculati* v. g. Cardamindi. Aquilegiæ, Delphinii.

Ex *Tetrapetalis* irregulares maxime deprehenduntur *Leguminoſæ* v. g. Piſum, Lens, Cicer, Lathyrus, quorum flos dicitur papilionaceus, ſcilicet, quoniam expanſas papilionum alas refert, cujus ſuperior reflexa pars vocatur vexillum, inferior carina, duæ laterales, alæ. Dantur tamen etiam & aliæ inter Tetrapetalos irregulares v. g. Fumaria, Thlaſpidium, Eſula &c.

Ex *Pentapetalorum* numero irregulares plurimum ſunt *umbelliferæ* v. g. Pimpinella, Sphondylium, Angelica, Leviſticum.

Ex *Hexapetalis* irregulares ſunt præcipue *orchides*.

Quemadmodum autem hactenus dicta de floribus *ſimplicibus* intelligenda ſunt; ita progreſſum facimus ad Flores *Compoſitos* ſeu Aggregatos. Ad hos conſtituendos requiritur 1) ut e communi Perianthio prodeant plures floſculi 2) ut iidem arctiſſime condenſati exiſtant. Horum potiſſimum ſunt tres Claſſes 1) *quæ conſtant ex regularibus tantum ſeu floſculis Monopetalis*, *iisque* vel *ejusdem generis* v. g. Tanacetum Santolina, Abſynthiũ, Eupatorium. vel *diverſi generis* v. g. Carlina, Nymphæa. vel 2) *ex irregularibus tantum*, iisq; *iterum* vel *ejusdem generis* v. g. Scorzonera, Hieracium, Piloſella &c. vel *diverſi generis* v. g. Tagetes. vel 3) *ex regularibus & irregularibus ſimul*, & quidem vel *regularibus in medio*, ſeu diſco, *& irregularibus in ambitu*, ſeu radio. v. g. Cyanus Bellis, Millefolium, Tuſſilago, vel *regularibus in ambitu & irregularibus in medio* v. g. Granadilla Nigella, Aconitum.

Hæc igitur ſunt, quæ ſummo generi inveniendo inſerviunt. Tranſimus ad ſecundũ requiſitum, ſeu ad ea, quæ *genus ſubalternum ſeu proximum* conſtituunt, ſcilicet *Fructum*. Non vero negandum, etiam Flores quandoque ſuppeditare genus ſubalternum, quando peculiari forma, qua ab aliis facile diſcernuntur, gaudeant. Imprimis tamen Fructus h. l. habenda eſt ratio.

Sub

Sub Fructuum nomine vero comprehenduntur etiam Semina ,eaque ſecundum Hermannum, Rivinum & alios ſunt vel.

1) *Nuda*, ſcilicet, quæ ultra proprium corticem nullo alio integumento veſtiuntur. De quorum tamen exiſtentia aliqui dubitant & nullum ſemen capſula deſtitutum eſſe aſſerunt. Quam litem tamen dirimendam mihi non ſumo. vel 2) *tecta ſunt Capſula*, eaque vel (1) *Carnoſa* (2) vel *membranacea.*

I. *Plantæ, quæ nuda* ſemina proferunt,ſunt potiſſimum 1) *umbelliferæ* v. g. Augelica, Oſtrutium, Pimpinella, Aniſum, Fœniculum &c. 2) *verticillatæ* v. g. Salvia, Mentha, Pulegium, Serpillum 3) *Aſperi foliæ* v. g. Borrago, Cynogloſſa, Cerinthe, Rubia 4) *Corymbiferæ* v. g. Chryſanthemun. 5) *Pappeſcentes non lacteſcentes* v. g. Senecio, Conyza, Jacobæa. 6) *Pappeſcentes & lacteſcentes* v. g. Lactuca, Taraxacum, & aliæ quædam.

II. Quæ tecta ſunt *capſula carnoſa*; Scilicet quæ membrana tenui,pulpam intus humidam vel ſolidiorem & ſemina vel membranacea vel oſſea involvente, cinguntur, ſuntque vel *pomifera* v. g. Malus, Pyrus, Cucurbita, Citrus, vel *pruniferæ* Prunus, Acacia, Malus Armenica vel *Bacciferæ* v. g. Ribes, Groſſularia,Solanum.

III. Quæ *capſula* (quod etiam Pericarpium audit,)

audit,) *membranacea* teguntur vel gaudent capſula 1) *breviori*, quae Silicula vocatur, v. g. Myagrum, Veronica, Thlaſpi &c. vel 2) *longiori* ſeu ſiliquoſa dicta v. g. Chelidonium, Cheiri, & Leguminoſæ plantæ. *Capſulæ* in genere ſunt vel *ſimplices*, ſcilicet, quæ unicam cavitatem habent, in qua ſemina latent, vel *compoſitæ*, quæ in plures capſulas ſeu cellulas intus diſtinguuntur, hinc vocantur 1) *unicapſulares* v. g. Primula Veris, Lychnis, Lathyrus. 2) *Bicapſulares* v. g. Centaurium minus, Antirrhinum. 3) *Tricapſulares* v. g. Hyacinthus Ornithogalum, Convolvulus, Campanula. 4) *Quadri capſulares* v. g. Stramonium, Cuſcuta, Ruta, Aquilegia. 5) *Quinquecapſulares* v. g. Acetoſella, Ficoides 6) *Sexcapſulares*, quæ pluribus quam ſex capſulis vel cellulis gaudent v. g. Abutilon, Caltha, Linum.

Capſulæ ſunt vel 1) *Monoſpermæ*, quæ unicum ſemen includunt vel 2) *Polyſpermæ*, quibus plura ſemina continentur.

Differunt interim ipſa Semina diverſimode 1) *ratione ſubſtantiæ* ſunt *vel* dura, Dactylorum, Cynosbati, Meſpilorum *vel* mollia, Amygdalarum Pinearum *vel* membranacea, Anethi, Cumini 2) *ratione Quantitatis vel* magna v. g. Juglandis Caſtaneæ *vel* mediocria, Lupini, Piſi, Fabarum *vel* parva, Hormini, Salviæ *vel* minima, Blattariæ Nicotianæ,

tianæ,

tianæ, Hyperici. 3) *ratione figuræ* ſunt *vel* rotunda, Salviæ, Hormini, *vel* longa Fraxini, Scandicis *vel* triquetra, Lapathi acuti, Fagopyri *vel* anguloſa, Nigellæ, Cichorii *vel* ſemi lunaria, Malvæ Altheæ *vel* reniformia, Phaſeoli, Colutheæ, Geniſtæ *vel* lata Anethi, Angelicæ, Paſtinacæ. 4) *ratione ſuperficiei vel* lævigata Cerinthe *vel* ſplendentia, Aquilegiæ Amaranthi, *vel* rugoſa Meliloti, Thalictri *vel* hirſuta Dauci, *vel* barbata, Clematitidis, *vel* crinita, cardui *vel* echinata Caucalidis, Echinophoræ *vel* ſtriata, Laſerpitii *vel* depreſſa Lini, Lentium, Lupini 5) denique *ratione coloris, ſaporis & odoris.*

Supereſt III. um Membrum, quod ſuppeditat *differentiam ſpecificam* ſeu notas, quibus Plantæ a ſuis congeneribus vel ſpeciebus diſtinguuntur. Deſumuntur vero illæ ab omnibus plantæ partibus, a floribus, fructu, capſulis, foliis, caulibus, radicibus.

Cum de prioribus jam actum ſit, reliquorum differentias extantiores hic nominabimus & quidem.

I. Quoad *Folia*. Ea ſunt 1) *ratione ſuperficiei vel* lanuginoſa v. g, Lychnidis, Jacobææ Marinæ, Marrubii albi *vel* hirſuta, Conſolidæ majoris *vel* lævi Pyrorum, *vel* aſpera, Lapathi 2) *ratione figuræ vel* teretia ſeu rotunda, Sedi vermicularis *vel* fiſtuloſa, Cepæ, *vel* mucro-

mucronata, Fritillariæ, Gladioli *vel* triquetra, Junci, Cyperi *vel* cordata, Aſari *vel* pinnata Lathyri, Fabæ, Piſorum *vel* digitata, Tormentillæ, Pentaphylli, Hellebori, Lupini. 3) *ratione marginis* ſunt *vel* margine integro, Pyri, Mali *vel* ſerrato, Ptarmicæ, *vel* longius rariusque dentato, Taraxaci, Hieracii *vel* laciniato, Geranii moſchati, Quercus. 4) *ratione coloris vel* maculata, Pulmonariæ, Perſicariæ, Salviæ *vel* variegato, Amaranthi, tricoloris, Vincæ foliis pictis *vel* nigra Ocymi *vel* rubra Amaranthi. 5) *ratione durationis vel* ſemper virentia, Buxi, Juniperi, Abietis *vel* decidua ſeu caduca, Ceraſi, Iridis folio deciduo.

II. Quod *caulem* attinet, eſt ille 1) *ratione ſubſtantiæ vel* mollis Bulboſarum, Tulipæ *vel* nervoſus, Plantaginis, *vel* cavus, frumentorum, arundinis. 2) *ratione Figuræ vel* anguloſus, triangularis, quadrangularis, ſexangularis octangularis, *vel* non foliatus, Bulboſorum, Taraxaci *vel* foliatus, Lactucæ, *vel* alatus, Lathyri *vel* non ramoſus, Coronæ Imperialis, *vel* ramoſus, Abſynthii *vel* geniculatus, Arundinis, *vel* nodoſus, Caryophilli, 3) *ratiane ſitus vel* erectus, urticæ majoris, *vel* repens, Anſerinæ, Quinquefolii *vel* Scandens, Convolvuli, Cucurbitæ. 4) *ratione ſuperficiei vel* lævis, Nymphææ *vel* lanuginoſus, Verbaſci, Lychnidis Coronariæ,

vel

vel ſpinoſus, Roſæ, Rubi *vel* ſquamoſus, Dactyli.

III. *Radices* differunt 1) *ratione ſubſtantiæ*, ſuntque *vel* molles ſeu carnoſæ, Raphani, Raparum, *vel* lignoſæ, arborum, fruticum, *vel* bulboſæ tunicatæ, Cepæ, Tulipæ, *vel* ſquamatæ, Lilii albi, *vel* tuberoſæ, Cyclaminis 2) *ratione figuræ vel* rotundæ, Victorialis, Saxifragiæ albæ, *vel* intortæ, Biſtortæ, *vel* geniculatæ, Arundinis *vel* Sigillatæ Polygonati *vel* fibroſæ, Vincetoxici. 3) *ratione coloris vel* albæ, Aaronis, Hellebori albi *vel* nigræ, Hellebori nigri, Symphiti majoris *vel* rubræ Anchuſæ, Rubiæ *vel* luteæ Rhabarbari, Chelidonii majoris 4) *ratione ſaporis* vel dulces, glycirrhizæ, Polypodii *vel* amaræ, Gentianæ, *vel* acris, Armoraciæ, Pimpinellæ, *vel* aromaticæ, Angelicæ, Leviſtici, *vel* acerbæ adſtringentes, Tormentillæ, Ireos paluſtris,

Viſis igitur Plantarum Claſſibus & enumeratis, quæ Definitionem earundem ingrediuntur, vr clarius eluceſcat prædictorum ratio, aliquot exemplis rem ipſam illuſtrabimus. Notæ ſunt ſub nomine Hederæ duæ ſpecies, arborea & terreſtis, ſi vero utramque examinaverimus, deprehendemus neque flore neque fructu convenire, adeoque non eodem nomine appellandas eſſe juxta Canonem ſuperius allegatum. Hedera enim arborea

borea eſt planta flore regulari pentapetalo, ſemine latente intra Pericarpium ſucculentum ſeu baccam, caule ſcandente & repente prædita. Hedera vero ſic dicta terreſtris eſt planta flore irregulari Monopetalo, ſemine nudo quaterno, barba quadripartita, galea diviſa, foliis rotundis crenatis prædita. Cum igitur nullo modo cum priori conveniat aliud nomen ipſi imponendum ſcilicet Chamæciſſi.

Ita ſub ſtœchadis nomine nota ſunt Arabica & Citrina. Arabica eſt planta flore irregulari monopetalo, barba tripartita galea diviſa, ſemine nudo quaterno, flore in ſpicam congeſto. Citrina ita dicta eſt planta flore compoſito ſeu aggregato ex regularibus tantum ejusdem generis, ſemine nudo plurimo pappoſo. Ergo quoniam cum priore non convenit potius Elichryſum vocetur.

Ita ſi Caltha paluſtris ad leges Definitionis deſcribenda eſſet, hæc ejus foret definitio: Caltha paluſtris eſt plauta flore regulari Pentapetalo (*genus ſummum*) ſemine latente intra Pericarpium membranaceum multicapſulare (*genus ſubalternum ſeu proximum* (capſulis radiatim diſpoſitis & deorſum reflexis donata (*differentia ſpecifica.*)

Ita Ribes eſt planta flore regulari monopetalo, in quinque lacinias diviſo (*genus ſummum*) baccifera & polyſpermos. (*genus ſubalter-*

ſubalternum baccis racematim diſpoſitis (*differentia ſpecifica*). Item Lathyrus eſt planta flore tetrapetalo, irregulari papilionaceo (*genus ſummum*) ſemine ſubrotundo, incluſo ſiliquæ mediocri (*genus proximum*) & cum plures ſpecies Lathyri dentur, diſcernuntur a ſe invicem vel a colore, ita alius eſt flore purpureo, alius flore cœruleo picto, alius flore luteo, alius flore albo, vel foliis v. g. Lathyrus foliis pinnatis.

Item Ranunculus eſt Planta flore regulari Pentapetalo (*genus ſummum*) ſemina plura in unum capitulum congeſta (*genus proximum*) differunt & hi ſpecietenus vel ratione foliorum, dum alius folio hirſuto, alius longo, ſerrato & non ſerrato, folio Aconiti, Cotyledonis, vel ratione radicis, radice tuberoſa, bulboſa, grumoſa, vel ratione capſulæ ſeminalis, echinatus Ranunculus audit.

Et ita Rudimenta Botanices brevibus delineaſſe ſufficiat.

MARTIUS & APRILIS.

Acer campeſtre, Ahorn-Baum zu Giebichenſtein
Acetoſa pratenſis, Sauer-Ampff. Auf den Wieſen. Offic. Herb. Sem. Rad.
--- criſpa krauſer Sauer-Ampff. ibid,
--- arvenſis lanceolata minor, Schaaff-Ampffer auf ungebaueten Ackern und Hügeln.

 lanceo-

--- lanceolata repens, kleiner Schaaf-Ampfer Auf ſteinigten Feldern bey Giebichenſtein.
Acetoſella flore albo majore, Buch-Ampfer. In dem Lotherslebiſchen Holtze.
Aconitũ hyemale, Wolffs-Wurtzel. In Gärten.
Adonis radice Hellebori flore Buphthalmi; Helleborus niger Hippocratis, ſchmahl-blätterige Nieß-Wurtzel. Hinter Ließkau an dem Stein-Bruche. Off. Rad.
Amygdalus, Mandel-Baum. In Gärten Off. Fruct.
--- nana, Zwerg-Mandel-Baum. Ibid.
Armeniaca, Morellen-Baum. Ibid.
Aſarum, Haſel-Wurtz. In dem Zwinger am Moritz-Thor und in Schmoniſchen Bergen.
Auriculæ urſi variæ ſpecies, colorum diverſitate mire ludentes, Bären-Oehrlein. Aurickeln. In Gärten.
Bellis ſylveſtris fl. albo, Gänſe-Blümigen Maßlieben. Auf allen Angern und Wieſen. Offic. Herb. Flor.
--- limbo purpureo, Gänſe-Blümgen mit rothen Kanthen. Ibid. It.
--- hortenſis fl. albo } pleno, gefüllte weiſſe/
------ fl. rubro } rothe/ſcheckichte/Maß-
------ fl. variegato } lieben/ Tauſend ſchön.
In Gärten. Off. Herb. Flores.
Berberis, Berbis-Beeren. Ib. Off. Fr. Cort.
Betula, Bircke. In der Heyde. Offic. Cort. Fol.
Burſa Paſtoris minor, klein Teſchel-Kraut. In den

den Stadt-Graben / und andern ſandigten Orten. Off. Herb.

---- major, groß Teſchel-Kraut. In den Gärten und Feldern.

Buxus, Buchs-Baum. In Gärten Offic. Herb. Lign. Fol.

Caltha paluſtris, Dotter-Blume. Unter den Pulverweyden.

---- fl. pleno, gefüllte Dotter-Blume. In Gärten.

Cardamine, Gauch-Blume. Auf feuchten Wieſen.

Caryophillata, Benedicten-Kraut. In ſchattichten Püſchen und an den Wänden in den Gärten. Offic. Herb. Rad.

---- aquatica flore nutante, Waſſer-Benedicten-Kraut. In dem feuchten Puſche vor Seben und Liebenau.

Chamæciſſus, Hedera terreſtris, Gundermann. An den Zäunen der Gärten. Off. Herb.

---- minor & elegantior, kleiner Gundermann. In dem Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio.

Ceraſus major ſylveſtris fructu rubro & nigro, ſüſſer Kirſchbaum. Zu Guten-Berg.

---- pumila, kleiner Kirſch-Baum.

Ceraſorum variæ ſpecies. In Gärten. Off. Fruct. Gummi.

Chryſoſplenium, Saxifraga aurea, gülden Miltz-Kraut. An ſumpfichten Orten bey Seben und Lothersleben.

 Cochlea-

Cochlearia, Löffel-Kraut. In Gärten. Off. Herb. Sem.

Cornus (*mas*) Herlitzken. Ibid. Off. Fruct.

Corona Imperialis, Käyſer-Crone. Ibid.

Corylus, Haſel-Staude. In den Püſchen. Off. Fruct. Viſcum.

---- ſativa, fructu oblongo, Lamperts-Nüſſe. In Gärten. It.

Cotoneaſter Chamæmeſpilus, Zwerg-Noſſeln. Auf den Hügeln bey Kröllwitz und in Schmoniſchen Bergen.

Crocus vernalis fl. luteo | gelbe/ weiſſe/ blaue/
- - - - fl. albo | bundte/ Saffran-
- - - - fl. purpur: | Blume in Gärten.
- - - - fl. variegato |

Cydonia, Quitten. In Gärten Off. Flor. Fruct. Sem.

Dens caninus, Hunds-Zahn/ rothe Stendel-Wurtzel. In Gärten.

Equiſetum Kannen-Kraut. Auf den Wieſen Off. Herb.

Eruca latifolia, Barbarea Winter-Kreſſe. An den Gräben zu Reideburg und Paſſendorff. Off. Sem.

Eſula, Tithymalus, Cypariſſias Cypreſſen-Wolffs-Milch. An den Wegen und ſandigten Hügeln.

---- degener foliis punctatis, Cypreſſen-Wolffs-Milch mit punctirten Blättern. Ib.

---- major ſeu paluſtris, groſſe ſtaudigte Wolffs-

Wolffs-Milch. Im Gimmeritziſchen Puſche und in der Lucke. Off. Herb. Rad.

Fagus, Buchen/ In der Aue.

Ficaria, Chelidonium, minus, Feig-Wartzen-Scharbocks-Kraut. In den Gärten und feuchten Wieſen Off. Herb. Rued.

Fraxinus, Eſchen-Baum. Zu Cröllwitz und Bennſtedt. Off. Fol. Sem. Cort.

Fritillaria, Kybitz-Blume. In Gärten.

---- polyanthos, Kybitz-Blume mit vielen Blumen. Ib.

Fungus eſculentus rugoſus, Morcheln. Im Mittel-Holtze und bey Gutenberg.

Gentianella verna, groſſe frühzeitige Gentianella. In Gärten.

Geranium Malvæ folio crenato, Tauben-Fuß auf ſandigten Hügeln.

---- Supinum cicutæ folio, kleiner kriechender Storch-Schnabel. In den Stadt-Graben und Feldern.

Gramen cyperoides hirſutum, Haaricht-Cyper Graß. Auf den Hügeln an der Heyde.

---- minus cyperino non abſimile, klein Riet-Graß. Bey Giebichenſtein auf der Wieſe.

---- præcox cyperino nemoroſo non abſimile. Auf den Wieſen bey Seben.

Groſſularia, Stachel-Beeren. In Gärten.

Helleborus niger fl. albo, ſchwartze Nieß-Wurtzel mit weiſſer Blume. Ib. Off. Fol. Rad.

Helleborus niger fl. viridi, ſchwartze Nieß-Wurtzel mit grüner Blume. Off. Fol. Rad.
Helleboraſtrum, falſche Nieß-Wurtzel. Ib.
Hepatica fl. ſimplici rubro } Leber-Kraut. In
- - - - - cœruleo } den Schmoniſchen Bergen.
--- fl. pleno cœruleo } gefüllte/ blaue/ rothe/
- - - - purpureo } und weiſe Leber-Blu-
- - - - albo } men. In Gärten. Off. Herb. Flor.
Hyacinthus fl. oblongo cœruleo } weiß und
- - - - - - - albo } blaue Hyacinthe. Ib.
--- orientalis fl. ſimplici } ſchlechte und gefüllte
- - - - fl. pleno } Orientaliſche Hyacinthen. Ibid.
--- Botryoides, Trauben Hyacinth. Ib.
--- Stellatus, Stern-Hyacinth Ib.
Iris humilis præcox fl. violaceo, frühzeitigte niedrige Schwertel. In Gärten
--- Perſica Perſiſcher Schwertel.
--- anguſtifolia, ſchmahlblätterige Schwertel.
---- fl. purpureo } Purpur farbige und blaß-
--- fl. ochroleuco } gelbe Schwertel Ibid. Off. Rad.
Lamium fl. purpureo maius, groſſe taube Neſſel mit rothen Blumen. In Hecken.
-- -- minus, kleine rothe taube Neſſel. Ib.
---- fl. albo, Galeopſis, weiſe Taube Neſſel. Ibid. Off. Herb. Fl.

fl. luteo

- - - - fl. luteo, gelbe taube Neſſel in der Aue.
- - - - folio caulem ambiente, kleine Taube Neſſel. In den Weinbergen und Kohl-Gärten.

Laureola, Mezereum, Kellers-Halß. Im Lotherslebiſchen und Schmoniſchen Gehöltze Off. Fruct.

Levcoium bulboſum, Schnee-Glöcklein. In den Liebenauiſchen und Lotherslebiſchen Holtze.

— triphyllon, kleine Schnee-Glöcklein. In Gärten.

Locuſta, Valerianella præcox, Feld-Rapuntzel / auf den Rheinen der Aecker.

Lychnis graminea hirſuta, weiſe Acker-Näglein. An den Straſen.

- - umbellifera, auf brache liegenden Feldern bey Giebichenſtein und Kröllwitz.

- - glabra fl. maiore, gramen floridum, Blumen-Graß. Im Zorgs.

Malus, Apffel-Baum. In Gärten.

Melilotus minima, Trifolium arvenſe, Feld-Klee. Auf den Hügeln bey Giebichenſtein und auf trockenen Wieſen.

Mercurialis ſpicata ſ. fœmina, Bingel-Kraut weiblein. Im Zorgs.

— teſticulata ſ. mas, Bingel-Kraut-Männlein. Ibid. Off. Herb.

Moſchatellina, Bieſen-Kraut. Ibid. und im Lindberge.

Muſcari fl. obſoleto, Bieſen-Hyacinth. In Gärten.

Muſcus polytrichoides, Polytrichum minus, klein gulden Wieder-Todt. In den Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio und in der Heyde.

-- -- capitulo rotundo, an den Giebichenſteiniſchen Felſen.

Napus, Bunias, Rübſaat. Auf den Aeckern. Off. Sem.

Nemoroſa ſ. Ranunculus nemoroſus fl. albo & rubro, weiß und roth Wald-Hähnlein. Im Sebiſchen Puſche und im Zorgs.

---- fl. luteo, gelb Wald-Hähnlein Im Pellbergiſchen Puſche. Im Zorgs.

---- fl. pleno, gefült Wald-Hähnlein. In Gärten.

Narciſſus fl. luteo tubo brevi ⎫ gelbe/ ſchlechte/
- - - - - tubo longo ⎬ und gefüllte
- - - - - pleno, ⎭ Narciſſe. In Gärten.

Ornithogalum luteum majus, gelbe Feld-Zwiebel. In feuchten Wieſen und Gärten.

-- -- minus. In dem Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio.

---- umbellatum album minus, weiſe Feld-Zwiebel. Auf den Kirchhoff zu Trotta.

-- -- fl. albo majus. Stern-Blümgen. Ib.

---- Pannonicum ſpicatum, Graß-Weiſe Feld-Zwiebel. In Garten.

Orobus

Orobus ſylvaticus latifolius⎫ frühzeitige Er-
- - - - anguſti folius⎭ ven. In dem Lotherslebiſchen und Schmoniſchen Holtze.

Paris, Einbeer. Im Liebenauiſchen und Lotherslebiſchen Holtze. Off. Herb. Baccæ.

Paronychia, Nagel-Kraut. An den Hügeln hin und wieder.

Pentaphyllum repens minus, klein kriechend Fünff Finger-Kraut auf den Gimmeritziſchen Stein-Felſſen.

---- ſylvaticum minus fl. albo, Wald Fünff-Finger-Kraut. Ibid. und zu Dölau.

Perſica, Pfirſig-Baum. In Gärten Off. Fl. Fol. Nuclei.

Petaſites, Peſtilentz-Wurtzel bey Canön und Teiche an den Graben. Off. Herb. Rad.

Populus alba, majoribus foliis, weiſe Pappel-Weyden. An der Pulver-Muhle. offic. Gemmæ.

---- nigra, ſchwartze Pappel. Im Tappel-Werder bey Lettin.

---- tremula, Aſpen. In dem Petersbergiſchen und Mittel-Holtze.

Primula Veris vulgaris odora flore luteo, wilde Himmel-Schlüſſel. Bey Seben und Gimmeritz. Off. Herb. Flor.

--- inodora fl. pallido, wilde Himmel-Schlüſſel. Auf den Wieſen bey Lochau und Seben.

- - - odor fl. ſimplici } varij coloris Pri-
- - - fl. pleno } meln. In Garten.
- - - odora calice florido } Allerhand Sor-
- - - - fiſſo } ten von Pri-
- - - - folioſo } meln.
- - caule & calice folioſo }

Prunus ſylveſtris, Acacia noſtras, Schlehen-Dorn. In den Hecken. Off. Flores Fructus, Rad.

Prunus ſativa, Pflaumen-Baum. Off. Fruct.

Pſeudo fumaria major fl. albo } Fumaria bul-
- - - - - - fl. rubro } boſa, groſſe Hohl Wurtzel. Im Pellbergiſchen Holtze. Im Zorgs. Off. Rad.

---- minor, kleine Hohl-Wurtzel. ib. und in der Heyde.

Pulmonaria latifolia, breit blätterig Lungen-Kraut. Im Zorgs. Off. Herb.

---- maculoſa, gefleckt Lungen-Kraut. Im Liebenauiſchen und Lotherslebiſchen Holtze und in Gärten.

---- anguſtifolia, ſchmahl blätterich Lungen-Kraut. Im Dölauiſchen Puſche.

Pulſatilla fl. maiore, Küchenſchell. Auf den Gimmeritziſchen Berge und in der Heyde. Off. Herb.

---- fl. cinereo ſurrectior. In der Heyde

---- fl. minore nigricante, klein Küchenſchell. In der Heyde und auf den Giebichenſteiniſchen Hügeln.

Pyrus

Pyrus ſylveſtris, wilder Birn-Baum. Auf den Felde und in Püſchen.
--- domeſtica, Birn-Baum. In Gärten.
Quercus, Eiche. In der Aue und der Heyde. Off. Fol. glandes, cupulæ glandium.
Ranunculus nemoroſus folio imo ſubrotundo, Wald-Hahnen-Fuß. Bey Seben/ Reideburg und in andern Püſchen.
---- pratenſis erectus dulcis ſüſſer wieſen Hahnen-Fuß. Auf den Wieſen.
---- fl. pleno luteo } gelb und weiſſer gefüllt
- - - - - albo } Hahnen-Fuß. In Gärten.
Rapiſtrum, Hederich. In Korn-Feldern.
Ribes, Johannis-Beeren. In Gärten. Off. Fruct.
--- Alpinus dulcis, Hunds-Beeren. Im Lotherslebiſchen Holtze. Im Zorgs.
--- fructu nigro, In Gärten.
Salix vulg. arboreſcens, Baum-Weyden. Auf den Wieſen und Straſſen. Off. Fol.
--- fragilis amygdalino folio, Bruch-Glaß-Weyde. An der Saale.
--- rubra fragilis folio oblongo, rothe Band-Weyde. ib. und auf den Wieſen.
--- latifolia rotunda infra hirſuta, Saal-Weyde / Palm-Weyde. Auf ſumpfichten Wieſen.
--- pumila, kleine niedrige Erd-Weyde. In dem Bruche am Dölauer Teiche und zu Lieſkau.

Saxifraga

Saxifraga alba, weiſer Stein-Brech An den Hügeln zu Giebichenſtein und Gimmeritz. Off. Herb. Sem. Rad.

Squamaria, Dentaria major, Schuppen-Wurtzel. In den Schmoniſchen Bergen. Off. Rad.

Syringa fl. rubro } weiſer/rother Spaniſcher Holunder. In Gärten.
- - - albo
- - - Perſica

Taraxacum, Dens Leonis, Pfaffen-Röhrlein. Auf allen graſichten Orten. Off. Herb. Rad.

Thlaſpi perfoliatum majus } Thlaſpi mit durchwachs-Blättern.
- - - - - minus

In den Schmoniſchen Bergen.

Tridactylites tectorum, roth Stein-Vogel-Kraut. In dem Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio.

Trifolium lupulinum, Hopffen-Klee. Auf trocknen Wieſen und Feldern.

Tuſſilago. Huff-Lattich. An den Waſſer-Graben bey Seben und Rietleben. Off. Herb. Fl. Rad.

Tuliparum variæ ſpecies, Tulipanen allerhand Sorten. In Gärten.

Veronica Teucrii folio major, groß braun Manderlein. In Gärten und Wieſen.

--- minor, klein Gamanderlin. Auf ſchattichten Wieſen und in Püſchen.

--- ramoſior & procumbens, niedriger falſcher Ehren-Preiß. ibid.

folîis

--- foliis tri-& quinquifidis, ſeu rutæ folio, Hüner-Raute auf trocknen Aeckern und in Stadt-Graben.
--- Chmædris folio, blau Mänderlein. In den Feldern.
--- Hederæ folio, Mäuſedarm. In den Weinbergen und Küchen-Gärten.
Vicia minima ſegetum, kleine Feld-Wicke. In dem Stadt-Graben und auf andern Hügeln.
Viola Martia odora fl. purp. Mertz-Viole an graſichten Orten und in Gärten Off. Herb. Flor. Sem.
- - - fl. albo } rothe und weiſe Mertz-Viole
- - - rubro } ibid.
--- fl. pleno, gefüllte Mertz-Viole. In Gärten.
--- inodora, canina, Hunds-Viole. In Püſchen und Hecken.
--- rotundifolia paluſtris glabra. In dem Bruche am Dölauiſchen Teiche.
--- inodora hirſuta. In den Püſchen bey Seben.
--- præalta ſylveſtris, groſſe Wilde-Violen bey der Pulver-Mühle und im Gimmeritziſchen Puſche.
Viola longifolia arvenſis tricolor, Freyſam-Kraut. In Feldern.
--- tricolor ſpecioſior, diverſæ faciei, allerhand Sorten von Freyſam-Kraut/ Stieff-Mütterchen. In Gärten.
--- ſylveſtris lutea. In den Mittel-Holtze und Schmoniſchen Bergen.

Vinca,

Vinca, Pervinca, Sinngrün zu Reideburg. Off. Herb.

- - - fl. albo } weiß und roth Sinn grün.
- - fl. purpureo } In Gärten.

- - - foliis variegatis, Sinn grün mit geſcheckten Blättern.

Viſcum, Miſtel. In dem Nietlebiſchen Puſche. Off. Lign. Baccæ.

Ulmus campeſtris, Rüſtern. In dem Stadt-Graben / und an den Dörffern hin und wieder. Off. veſiculæ foliorum.

MAJUS.

Abies alba, weiſe Tanne. In der Heyde Off. Reſina.

Acetoſella fl. luteo, Buch-Ampffer. In Gärten. Off. Herb.

Alſine media, Hünerdarm. In den Gärten und auf brachliegenden Feldern. Off. Herb.

Anemone ſylveſtris fl. albo, weiſe Anemonen Rößlein. Im Dölauer Puſch und bey Gatenberg.

- - - hortenſis fl. ſimplici & pleno varii coloris, allerhand Arten von Anemonen. In Gärten.

Anſerina, Gänſerich. An den Wegen und auf feuchten Wieſen Off. Herb.

Aparine vulgaris, Philandropos, Kleb-Kraut hin und wieder in Hecken.

Aquilegia ſylveſtris fl. ſimplici, Ackeley Im

Sebi-

Sebiſchen Puſche. Off. Herb. Flor. Sem. Rad.

- - - fl. pleno varii coloris: Allerhand Sorten von Ackeley. In Gårten.

Arbor vitæ, Thya Theophraſti, Lebens-Baum. In Gårten.

Arum, Zehr-Wurtzel. Deutſcher Jngber zu Reideburg in der Burg und zu Püſch-Dorff. Off. Rad.

Aſtragalus ſylveſtris wild Süß-Holtz. Jm Dölauiſchen und Mittel-Holtze.

Aucuparia, Sorbus Aucuparia, Ebereſchen / Vogelbeer-Baum. Jm Sebiſchen und Gutenbergiſchen Püſche. Off. Fruct.

Bifolium, Pſeudorchis, Zweyblat / bey Seben / Nietleben / an feuchten Puſchichten Orten.

Biſtorta, Natter-Wurtzel. Auf feuchten Wieſen vor Seben und Gutenberg. Off. Herb. Rad.

Blattaria fl. luteo } gelb / braun und weiß
- - purpureo } Schaben-Kraut. Jn Går-
- - - albo } ten.

Bugula, Conſolida media, gülden Günſel. Auf dem Puſchichten Hügel bey Seben und Gutenberg Off. Herb.

Buphthalmus, Bellis Sylveſtris major groſſe Maßlieben / Kåſe-Blumen auf den Wieſen.

Calceolus Mariæ, Marien-Schüchlein. Jn den Schmoniſchen Bergen.

Carvum Wieſen-Kümmel auff den Paſſendorffiſchen Wieſen. Off. Sem.

Caſtanea

Caſtanea equina, Roß-Caſtanien. In Gärten.
Cauda Muris, Mäuſe-Schwäntzlein. Auff ſandigten Feldern bey der Heyde und Nietleben.
Ceraſus racemoſa, Padus Theophraſti, Vogel-Kirſchen. In dem Pellbergiſchen Holtze.
Cicuta fatua, wilder Kletten-Körſel. In den Hecken.
Chamomilla, Camillen. In Feldern.
Chærefolium ſativum, Körſel. In den Diemitzer Kraut- und andern Küchen-Gärten. Off. Herb. Sem.
- - - ſylveſtre, wilder Körſel. In den Hecken und Sträuchen.
Chelidonium majus, Schell-Kraut. An den Wänden und Hecken. Off. Herb. Rad.
Convallium, Lilium Convallium, Mäyen-Blümlein. In der Heyde / zu Seben. Off. Flor.
Conſolida, Symphitum, Schwartz-Wurtzel. Auff allen Wieſen. Off. Herb. Rad.
- - - fl. purpureo. In Gärten.
Cornus fœmina, Härtriegel. In Hecken und Püſchen.
Criſta Galli, Hahnen Kamm. Auff allen Wieſen.
Cruciata hirſuta, Gülden Wald-Meiſter. In dem Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio, zu Dölau.
Cupreſſus, Cypreſſen-Baum. In Gärten. Off. Fol. Fruct. Lign.

Cyanus

Cyanus major caule alato; Centaurium majus, Türckiſche Korn-Blume. Ibid.

Cynogloſſa, Hunds-Zunge. Auff den Graſe-Rheinen hin und wieder. Offic. Herb. Rad.

- - - caulibus procumbentibus, Aparine major, groß Klebe-Kraut. In den Küchen und Kraut-Gärten.

Draba umbellata, Türckiſche Kreße. An den Rheinen der Aecker.

Ephemerum, Phalangium Virginianum, Virginianiſch Erdſpinnen-Kraut. In Gärten.

Eruca paluſtris major, ſinapi album, weiſſer Senff / groſſe Waſſer-Rancken. Bey Paſſendorff und Gimmeritz. Off. Sem.

Eſula amygdaloides latiſolia, Wolffs-Milch mit breiten Mandel-Blättern. In den Rocken-Holtze und an den Hügeln um den Peters-Berge.

- - - anguſtifolia ſeu Linifolia, Wolffs-Milch mit ſchmahlen Mandel-Blättern bey Kelme auff trocknen und ungebaueten Orten.

Evonymus, Spindel-Baum. In den Hecken und Püſchen.

Filipendula, rother Stein-Brech. Auff trocknen Wieſen. In der Heyde. Off. Herb. Rad.

Fragaria, Erdbeer-Kraut. Hin und wieder an graſichten Hügeln. Off. Herb. Rad. Fructus.

Frangula, Faul-Baum. In Hecken und Püſchen. Off. Cortex.

Fraxinella, Dictamnus albus, weiſſer Diptam. In der Heyde / zu Dölau. Off. Herb. Rad.

Fumaria, Erdrauch / Tauben-Kropff. In den Kraut- und Möhren-Aeckern. Off. Herb. Flor. Sem.

Fungus orbicularis exalbidus eſculentus, May-Schwämme / Weißlinge. Bey Lochau und Liebenau.

Geniſta trifolia, ſcoparia, Reh-Heyde. Groſſe Pfriemen. In der Heyde hinter dem Heyde Hauſe. Off. Flor. Sem.

- - - non aculeata, Pfriemen-Kraut ohne Stacheln. In der Heyde.

- - - aculeata, ſtachlicht Pfriemen-Kraut. Ibid.

Geranium Malvæ folio infimo rotundo, Storch-Schnabel. In den Korn-Feldern und Kraut-Gärten.

- - - Robertianum, murale, Rupperts-Kraut. An den Wänden / Mauren und Zäunen Off. Herb.

- - - fl. fuſco reflexo, Storch Schnabel mit Braunrother Blume. Im Zwinger vor den Raniſchen Thore.

Geum, Umbilicus Veneris, folio rotundo crenato, Frauen-Nabel. In Gärten.

- - - folio ſerrato oblongo. Ibid.

Gladiolus, Victorialis rotunda Allermann Harniſch Ibid. Off. Rad.

Globularia, Bellis Monſpelienſis, blaue Maßlieben. Bey Kelme an den Weinbergen.

Gnaphalium flore albo & rubro weiß und roth Ruhr-Kraut. Auf den Hügeln bey Giebichenſtein und an der Heyde. Off. Herb.

Gramen ſparteum ſ. pennatum, Feder-Graß. Auf den Hügeln in der Heyde und im Rocken-Holtze.

Hedera arborea, Epheu. In Petersbergiſchen Holtze und Schmoniſchen Bergen. Off. Herb. Fol. Gummi.

Helianthemum vulgare, Sonnen-Günſel. In der Heyde.

Heſperis flore rubro } viola Matronalis, Win-
- - - fl. albo } ter Violen. In Gärten

- - - noctu olens, Nacht-Violen Ibid.

Horminum, Sclarea, pratenſis, wilder Scharlach. Auf den Wieſen zu Gimmeritz. Seben. Off. Herb, Fl. Sem.

- - - fl. albo }
- - - rubro } Ibid.

- - - Indicum Indianiſch Scharlach-Kraut. In Gärten.

Hyacinthus Botryoides comâ cœruleâ, Hyacinthus Poëtarum, groſſer gepüſchelter Trauben-Hyacinth. Im Sebiſchen und Dölauiſchen Puſche.

Hydrophyllon, Dentariæ affinis, Zahn-Kraut. In Gärten.

Iris anguſtifolia folio deciduo, ſchmahlblätteriger Himmel-Schwertel. Auf den Wieſen zu Canon.

--- humilis latifolia ſylveſtris wilde Schwerdt-Lilien. Im Dölauiſchen Puſche.

--- paluſtris lutea, Pſeudo acorus, gelber waſſer-Schwertel. An den Paſſendorffiſchen und Reideburgiſchen Waſſer-Graben. Off. Rad.

Iſatis ſativa, Weydt. In Gärten.

Iuglans, welſcher Nuß-Baum. ibid. Off. Fol. Fruct. Cortex Fructus.

Iuncus aquaticus maximus ſeu Scirpus, major, groſſe Binſen. In den Paſſendorffiſchen Graben.

Juniperus, Wacholder. In der Heyde an der Straſſe nach Ließkau. Off. Herb. Gummi, Lignum, Baccæ.

Laurus, Lorbeer-Baum. In Gärten. Off. Fol. Cortex, Baccæ.

Lathyrus arvenſis radice tuberosâ, glans terræ, Erd-Nüſſe. In den fetten Korn-Feldern und Wieſen bey Gimmeritz.

--- ſylveſtris flore luteo, gelbe Wicken. Auf trocknen Wieſen.

--- annuus anguſtifolius, folio integro, breite Erbſen mit ſchmahlen Blättern. Bey Seben.

Levcojum biſcutatum Hieracii folio, Schild-

Schild-Veyel. An den Kröllwitziſchen Hügeln.

Linagroſtis major } gramen tomentoſum
- - - minor } Matten-Flachs. Auf ſumpfichten Wieſen bey Seben / Nietleben / Dölau.

Linoſyris, Linariæ ſimilis, falſch Lein-Kraut. In der Heyde / Rocken- und Mittel-Holtze.

Linum catharcticum amarum, klein Lein-Kraut. Auf den Wieſen. Off. Herb.

Lithoſpermum arvenſe radice rubra, Pſeudo-Anchuſa, wilder Stein- oder Meer-Hirſe. In den Saam-Feldern und Stadt-Graben. Off. Rad.

Lotus tetragonolobos fl. luteo, Schoten-Klee. Auf den Nietlebiſchen und Sebiſchen Wieſen.

-- -- corniculata glabra minor, Vogel-Wicken. Auf den graſe Rheinen und Hügeln.

-- major foliis & ſiliquis hirſutis longioribus, Vogel-Wicken. Auf den Wieſen.

Lychnis ſpumoſa, Spielſpelten. In der Heyde.

-- -- otites florem uſcoſo, Ohrlöffel-Kraut. Auf ſandigten Hügeln.

-- -- viſcaria anguſtifolia, rothe Margen-Rößlein. In der Heyde.

-- -- latifolia. In Mittel- und Rocken-Holtze.

-- -- graminea flore minore, klein Blumen Graß. In den Petersbergiſchen Holtze und in Feldern daſelbſt.

-- -- Marina, graue Meer-Lychnis. In Gärten.

Malus ſylveſtris, wilder Apffel-Baum. In den Püſchen und Höltzern.

Menianthes, Trifolium fibrinum, Biber-Klee. In Dießkauiſchen Teiche und bey Canón. Off. Herb.

Meliſſophyllon, groſſe Meliſſe. In Gärten.

Meſpilus ſylveſtris apii folio, Oxycantha, Weißdorn/ Hagedorn. In den Hecken und Püſchen.

Meſpilus, Miſpeln. In Gärten und im Sebiſchen Puſche. Off. Fol. Fruct. Sem.

Mollugo montana, groß Meger-Kraut. An den Hügeln bey Seben.

Morus, Maulbeer-Baum. In Gärten. Off. Fol. Fruct.

Myagrum, wilder Lein-Dotter. In den Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio.

Myoſotis, Echium ſcorpioides arvenſe blaue Maußöhrlein. In den Feldern und auf trocknen graſichten Hügeln.

Narciſſus fl. albo circulo croceo } weiſe Nar-
- - - - luteo } ciſſe. In Gärten.

-- -- juncifolius, Jonquillen ibid.

Naſturtium ſiliculoſum petræum Burſæ paſtoris

ſtoris folio, Stein-Kreße. In den Stadt-Graben / und an den Kröllwitziſchen Hügeln.

Nidus avis, Margendrehen / Vogel-Neſt. Im Nietlebiſchen Puſche und im Zorgs.

Ocymaſtrum, Lychnis hirſuta, fl. rubro, rother Wiederſtoß. Walcken-Kraut. In den Pellbergiſchen Puſche.

-- -- fl. albo, Auf den Lochauiſchen Wieſen.

-- -- fl. pleno, gefüllter Wiederſtoß. In Gärten.

Opalus, Sambucus aquatica, Schwelcken-Baum. In Gimmeritziſchen Puſche. In der Lucke und bey Paſſendorff.

-- -- fl. globoſo, Schneeballen. In Gärten.

Ophiogloſſum, Natter-Züngtein. Unter den Pulver-Weyden. Off. Herb.

Orchis magna latifolia, galeâ fuſcâ, groß Knaben-Kraut mit breiten Blättern. In den Petersbergiſchen Mittel Holtze. Off. Rad.

-- tota purpurea non maculata. In den Schmoniſchen Bergen.

-- parvis floribus multis punctis notatus, ſchmahlblätterich Knaben Kraut. Auf den Lothersleibiſchen Wieſen.

-- alba calcari longo, Fuchs-Hödlein.

-- -- minor purpurea, alis virentibus, Stendel-Wurtz. Auf graſichten Hügeln und trocknen Wieſen.

-- palmata latifolia non maculata longis calcaribus, Waſſer Händleins Wurtz.

-- -- minor calcaribus longis rubellis, Creutz-Blumen. In dem Lotherslebiſchen Holtze / auf den Wieſen und in der Lucke.

-- -- non maculata, galericulata. In der Heyde unter dem Heyde-Hauſe.

-- -- paluſtris anguſtifolia lævi folio, Händleins-Wurtzel. Auf den Wieſen zu Seben und Gutenberg.

-- -- pratenſis maculata. Ib.

Parietaria, Glaß-Kraut. In dem Zwinger am Ranſtädter Thore nnd an ſchattichten Orten. Off. Herb.

Pedicularis, roth Rödel-Kraut. Auf feuchten Wieſen zu Canön und in der Heyde.

Periclymenum rectum, je länger je lieber / Hunds-Kirſchen. In den Schmoniſchen Bergen und Lotherslebiſchen Holtze.

-- perfoliatum, je länger je lieber mit durchwachs Blättern. In Gärten.

-- non perfoliatum. ibid.

Phalangium non ramoſum, Erd-ſpinnen-Kraut. Am Gimmeritziſchen Steinbruche.

Philadelphus, wilder Jaſmin. In Gärten.

Piloſella major, groß Mauß-Oehrlein. Auf den Gimmeritziſchen Stein-Felſen / und in der Heyde. Off. Herb.

-- minor, klein Mauß-Oehrlein an vielen dürren ſandigten Hügeln an der Straſſe und in der Heyde.

Pinus,

Pinus, Fichten Baum. In der Heyde. Off. Strobuli.

Plantago latifolia, glabra major, groſſer breiter Wegerich. An den Wegen und Straſſen. Off. Herb. Sem. Rad.

-- -- minor kleiner Wegerich. Ib.

-- -- incana major, Schaaff-Zunge. Auf den Paſſendorffiiſchen Wieſen.

-- -- -- minor, kleine Schaaff-Zunge ib.

-- anguſtifolia major Spitziger Wegerich. Auf den Rechen der Aecker und trocknen Wieſen.

-- -- minor, kleiner ſpitziger Wegerich Ib. Off. Herb. Sem. Rad.

Pæonia fl. ſimplici ſ. Mas,	Gicht-Roſen/ Pathengen. In Gärten Off. Flor.
--- fl. pleno, rubro, carneo, albo.	

Sem. Rad.

Polygonatum latifolium, Sigillum Salomonis, Weiß Wurtzel, Zu Seben.

- -- fl. majore. In der Heyde.

Polygonum minus, cocciferum, Berg Wege-Graß. An den ſteinigten und ſandigten Hügeln bey Giebichenſtein / in der Heyde zu Gimmeritz.

Polytrichum, Adianthum aureum majus güldẽ Wiedertodt. Im Rietlebiſchen Puſche. In der Heyde an feuchten Orten. Off. Herb.

-- minus klein gülden Wiedertodt. Ib.

Primula Veris Auſtriaca, Oeſterreichiſche Primel. In Gärten.

Pſeudo-Chamæpitys Muntingii, Chamæpitys Auſtriaca, Oeſterreichiſche Feld-Cypreß. In dem Puſche hinter der Heyde nach Ließkau zu.

Ranunculus paluſtris apii folio, Waſſer Hahnen Fuß. An den Waſſer Gräben hin und wieder.

- - aquaticus folio rotundo, Fluß Hahnen Fuß. In den Paſſendorffiſchen Graben.

- - - folio capillaceo ſ. Peucedani folio ib.

- - - echinatus arvenſis. Acker Hahnen Fuß. Auf feuchten Korn Aeckern.

- - - pratenſis erectus acris Brennender wieſen Hahnen-Füß. Auff allen Wieſen.

- - - repens hirſutus dulcis, ſüſſer Haarichter Hahnen-Fuß. In den Gutenbergiſchen Rocken-und Mittel-Holtze.

- - - radice tuberoſâ, Antonius Rüblein. An Bergichten Graſichten Orten.

Raphanus aquaticus foliis profunde laciniatis, Waſſer-Rettich. An den Paſſendorfſiſchen Gräben.

- - - foliis ſerratis, Ibid.

Raphaniſtrum, Heyde-Rettich. In den Frucht-Aeckern.

- - - monoſpermum ſiliquâ minore rotundâ. Ibid.

Rapha-

Raphanus ruſticanus, Meer-Rettich. In Gärten zu Diemitz. Off. Rad.

Rapunculus Alopecuroides, groß Wald-Rapuntzel. In Lotherslebiſchen Holtze.

- - - corniculatus ſpicâ orbiculari, Wald-Rapuntzel. Im Rocken und Mittel-Holtze.

Rhabarbarum Muntingy, Rhabarber. Off. Rad.

Rhamnus Catharcticus, Creutz-Dorn. Im Gimmeritziſchen Puſche/ zu Seben und Paſſendorff. Off. Cort. Baccæ.

Rhodia radix, Roſen-Wurtzel. In Gärten. Off. Rad.

Roſa ſylveſtris flore odorato carneo, Heck-Roſe. Off. Flor. Fructus, Arilli, Fungus.

- - - ſylveſtris foliis odoratis, wohlriechender Dorn. Ibid.

- - - fl. albo, foliis Pimpinellæ glabris, wilde weiſſe Roſe. In Schmoniſchen Bergen.

Roſmarinus, Roßmarin. In Gärten. Off. Herb. Fl.

Rubia quadrifolia, groß Stern-Meger-Kraut. In den Mittelholtze.

- - - ſylveſtris lævis, wilde Färber-Röthe. Ibid.

Rubus Alpinus humilis, Stein-Beeren. In Lotherslebiſchen Holtze.

Rubus Idæus, Himbeeren. Im Seebiſchen Puſche und in Gärten. Off. Fructus.

Sabina, Sadebaum. In Gärten. Off. Herb.

Sambucus, Flieder-Holunder-Baum. An den

Zäunen

Zäunen der Gärten. Off. Fol. Flores, Fructus, Fungus.

Sanguiſorba minor Sperber-Kraut / Welſche Bibenell. Off. Herb. Rad.

Sanicula, Sanickel. In den Petersbergiſchen Holtze. Off. Herb. Rad.

Scabioſa officinarum, pratenſis, groſſe Acker-Scabioſe. Auf den Gimmeritziſchen und Sebiſchen Wieſen. Off. Herb. Flores, Rad.

Scandix, Pecten Veneris, Nadel-Körfel. In den Korn-Feldern bey Nietleben und Seben.

Scrophularia, Braun-Knoten-Wurtzel. An feuchten Orten bey Seben. Off. Herb. Rad.

Senecio minor, Creutz-Kraut. An den Wegen/ und auff den Aeckern und Garten-Beeten. Off. Herb.

Sideritis recta hirſuta, Glied-Kraut. Auff graſichten Hügeln zu Gimmeritz Seben / und in der Heyde. Off. Herb.

Sophia Chirurgorum, Seriphium, Sophien-Kraut. An den Wegen und auffgeworffenen Gräben. Off. Herb. Sem.

Spergula arvenſis, Spureſe. Auff ſandigten Aeckern um Kröllwitz und an der Heyde.

Spinachia, Spinat. In Gärten. Off. Herb. Sem.

Staphilodendron, Piſtacia Germanorum, Pimper-Nüſſe. Ibid. Off. Sem.

Statice, Caryophyllus montanus flore globoſo, See-Graß-Blumen. Auff graſichten Hügeln.

Tha-

Thalictrum caule & fl. purpureo, Braune Wieſen-Raute. In Gärten.

Thlaſpidium montanum luteum incanum majus, groß Schild Beſen-Kraut. Hinter der Stein-Mühle an den Felſen.

— — minus, klein Schild-Beſen-Kraut. Auff dürren ſandigten Hügeln bey Giebichenſtein.

Thlaſpi arvenſe foliis incanis, Bauren-Kreſſe. An den Püſchichten Hügel bey Seben.

Thymus, Thymian. Zu Diemitz. Off. Herb. Sem.

Tormentilla, Tormentille. In der Heyde / zu Nietleben / Seben. Off. Rad.

Tragopogon cœruleum, Bocks-Bart mit blaulichen Blumen. Im Rocken- und Mittel-Holtze.

Trifolium pratenſe album, weiſſer Wieſen-Klee. Auff den Wieſen.

— album minus glabrum, weiſſer glatter Wieſen-Klee. Bey Diemitz und Paſſendorff.

— erectum minimum, fl. carneo prolifero, auff den Paſſendorffiſchen Wieſen.

— purpureum, brauner Wieſen-Klee. Ibid.

Trollius flos, Ranunculus flore globoſo, Alpen-Hahnen Fuß. Auff der Sebiſchen Wieſe.

Vacci-

Vaccinia nigra, Myrtillus noſtras, Heydel-Beeren. In der Heyde. Off. Baccæ.
— rubra, Preiſſel-Beeren. In den Schmoniſchen Bergen.
Valeriana paluſtris major, Phu Ponticum, groſſer Sumpff-Baldrian. An feuchten püſchichten Orten zu Seben/Rietleben. Off. Rad.
- - - paluſtris minor, kleiner Baldrian. Ib.
- - - pratenſis, Wieſen-Baldrian. Auff den Wieſen zu Paſſendorff und Seben. Off. Rad.
Veronica officinarum ſ. Mas, Ehren-Preiß. In der Heyde. Off. Herb.
- - - ſerpilli folio, klein Ehren-Preiß-Weiblein. Auff den Wieſen zu Seben und Gutenberg.
- - - annua floſculis cauliculis adhærentibus, kleiner falſcher Hüner-Darm. In den Korn-Feldern.
Viburnum, kleiner Mälbaum. Zu Gutenberg/ und in Schmoniſchen Bergen.
Vicia ſepium, wilde Wicken. In den Hecken und Püſchen.
- - - annua purpuro cœrulea procumbens, Vogel-Wicke/ Feld-Wicke. In den Korn-Aeckern.
- - - ſativa, Saat-Wicken. Auff den Aeckern.
Vincetoxicum, Aſclepias, Schwalben-Wurtzel. In der Heyde zu Seben. Off. Herb. Rad.
Unifolium, Emblat. In der Heyde zu Seben.

JUNIUS.

Acorus, Calamus aromaticus, Calmuß zu Paſſendorff an den Waſſer-Graben. Off. Rad.

Adonis fl. miniato, rothe Wetter-Rößlein. In den Feldern bey Paſſendorff und Nietleben.

- - - fl. ochroleuco, gelbe Wetter-Rößlein. Ibid.

Alchimilla, Sinnau. In den Lotherslebiſchen Holtze. Off. Herb.

Allium montanum, Berg-Knoblauch. In dem Rocken- und Mittel Holtze.

Alſine latifolia altiſſima, groß Vogel-Kraut. In dem Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio. An ſchattichten Püſchen. Off. Herb.

- - - minor multicaulis, kleiner Hüner-Darm. An ſchattichten Orten.

- - - aquatica longifolia Brunnen-Vogel-Kraut bey Seben und Gutenberg.

Auchuſa puniceis floribus minor, kleine rothe Ochſen-Zunge. Auff dürren ſandigten Hügeln und Weinbergen bey Giebichenſtein. Off. Rad.

Anethum, Dille. Auff den Möhren- und Kraut-Aeckern. Off. Herb. Flores Sem.

Anthyllis Lagopodium luteum, gelber Haſen-Klee. An den ſandigten Hügeln und Straſſen.

Antirrhinum arvenſe minus, klein Feld-Orandt.

randt. In den Rocken-Feldern bey Diemitz und Seben.

Aſparagus ſativa, Spargel. In Gärten.

- - - ſylveſtris, wilder Spargel. In der Heyde. Off. Herb. Sem. Rad.

Aſter montanus ſalicis folio, gelb Berg Stern-Kraut. Zu Seben und in der Heyde.

Aſtragalus Canadenſis, Wicken von Canada, In Gärten.

- - - ſiliquâ curvâ, Wicken mit krummen Schoten Ibid.

Aurantia, Pomerantzen. In Gärten. Offic. Flor. Fruct. Sem. Cortex.

Beccabunga, anguſtifolia minor, Veronica aquatica minor, Schmalblätteriche Bachbungen. Am Ließkauiſchen und Dölauiſchen Teiche.

- - - latifolia ſubrotunda major, Bachbungen. In flieſſenden Bächlein bey Seben und Gutenberg.

- - - latifolia minor, kleine Bachbungen. Ibid. Offic. Herb.

Bella Donna, Doll-Kraut mit ſchwartzen Beeren. Im Rannſtädtiſchen Zwinger.

Beta alba, weiſſer Mangoldt/ Bete. In den Diemitzer Kraut-Gärten. Off. Herb. Sem. Rad.

- - - rubra, rother Mangoldt. Ibid.

Betonica, Betonien. In der Heyde und in Petersbergiſchen Höltzern. Off. Herb. Fl. Rad.

Borrago, Borragen. In Gärten. Off. Herb. Fl. Rad.

- - - ſylveſtris, Bugloſſum ſylveſtre minus, wilde Ochſen-Zunge. In den Kraut-Gärten bey Diemitz.

Braſſica ſylveſtris perfoliata, Feld-Kohl mit Durchwachs-Blättern. In Sommer-Feldern / bey Schraplau und Erdeborn.

-- -- foliis circa radicem cichoraceis aſperis, Turritis, langſtänglichter Wald-Kohl/ mit Hindläufft-Blättern. In der Heyde/ im Mittel Holtze und zu Seben.

Brunella, Braunelle. Auff trockenen Wieſen und Rheinen. Off. Herb.

- - - fl. majore, Braunelle mit groſſen Blumen. An den Hügeln zu Seben und hinter der Heyde.

Bryonia, Zaun-Gicht-Rübe. An den Zäunen zu Diemitz. Off. Herb. Rad.

Bugloſſum flore pullo, Ochſen-Zunge. In fetten Korn-Feldern. Off. Herb. Flor.

Butomus, Juncus floridus, Cyper-Schwertel. An den Paßendorffiſchen Graben.

Calamintha flore majore, groſſe Berg-Müntze. In Gärten.

- - - flor. minore, gemeine Berg-Müntze. Ibid. Off. Herb.

Campanula minor rotundifolia, kleine Milch-Glöcklein. Auff trocknen graſichten Orten und Hügeln.

- - - hirſuta echii foliis, rauche Wald-Glöcklein. Im Petersbergiſchen Holtze.

- - - urticæ folio, Hals-Kraut. Ibid.
- - - flore majore, Mariana, wilde Marien-Glöcklein. In Lotherslebiſchen Holtze.

Carduus galactites, foliis ſubtus lanuginoſis, weiſſe Wege-Diſtel. Bey Diemitz.

Caryophillus ſylveſtris latifolius, Donner-Näglein. Umb Giebichenſtein und Kröllwitz an den Straſſen.
- - anguſtifolius, wilde Stein-Näglein. ibid.
- barbatus fl. ſimplici albo
- - - rubro
- - - variegato } Cartheuſer-Näglein.
- - fl. pleno, gefüllte Cartheuſer-Näglein. In Gärten.

Caucalis, Kletten-Körfel. In den Stadt-Graben/ und andern aufgeworffenen Gräben.

Cerinthe fl. luteo
- fl. purpureo } Cerinthe. In Gärten.

Chamædrys, Edel Gamanderlein. In Ließkauiſchen Puſche und an den Kelmiſchen Weinbergen. Off. Herb.

Chamomilla inodora, wilde Camille. An den Wegen und Straſſen.

Chriſtophoriana, Chriſtophels-Kraut. In Lotherslebiſchen Holtze.

Cicutaria latifolia fœtida, ſtinckender Schierling. In dem feuchten Puſche bey Seben.

Citrus, Citronen-Baum. In Gärten. Off. Flor. Fol. Sem.

Clema-

Clematis cœrulea, fl. ſimplici, blaue Wald-Rebe. In Gärten.
-- -- fl. pleno ibid.
-- Pannonica, Ungariſche Wald-Rebe ib.
Cochleata cochlea glabrâ } Allerhand Sorten
-- -- hiſpidâ } von Schnecken-
-- -- compreſſa, } Klee. ibid.
-- -- durius echinata }
Convolvulus minor arvenſis, kleine Winde. Auf ſandigten Feldern.
Conyza cœrulea, kleine Dürr-Wurtzel/ Beruff-Kraut. Zu Seben und Gutenberg auf den Hügeln. Off. Herb.
Coriandrum, Coriander. In Gärten Off. Sem.
Coronilla, Purpur-Braune Peltſchen. An den Hügeln bey Giebichſtein und Gutenberg.
Coronopus, Plantago coronopi folio, wilder Krähen-Fuß. Bey Kelme an der Sultzke.
-- minima, kleiner Krähen-Fuß ib.
Cotula fœtida, Hunds-Camille/ an ungebaueten Oertern an den Döffern Off. Herb.
Cucumis, Gurcken. Zu Diemitz. Off. Sem.
Cyanus ſegetum, blaue Korn-Blume. Auf den Frucht-Aeckern Off. Flor.
-- -- fl. albo } Allerhand Sorten von
-- -- purpureo } Korn-Blumen. In Gär-
-- -- variegato } ten.
Cynapium, Cicutaria apii folio, Gleiß-Peterlein. Auf den Möhren- und Kraut-Aeckern.
Delphinium vulgare Calcatrippa, wilde Rit-

ter-Sporn. Auf den Saam-Feldern. Off. Fl. Sem.

Digitalis lutea, gelber Fingerhut. Im Rocken- und Mittel-Holtze. Im Ließkauiſchen Puſche.

Doronicum Plantaginis folio, groß Lucians-Kraut. In der Heyde.

Drymopogon, Wald-Bart. Im Lotherslebiſchen Holtze.

Echioides fl. coeruleo, wilde Ochſen-Zunge. Auf ſandigten Hügeln.

Echinophora, Caucalis echinata, Acker-Kletten. Auf den Aeckern zu Seben und Nietleben.

Echium vulgare, wilde Ochſen-Zunge. An aufgeworffenen Graben und Land-Straſſen.

Equiſetum longioribus ſetis, Kannen-Kraut. In Gerſten- und Haber-Feldern. Off. Herb.

Eſula Platyphyllos ſeu Characias, Wolffs-Milch. Auf den Aeckern und an den Hecken.

-- ſoliſequa, Sonnen-Wendende Wolffs-Milch. An ungebaueten und gebaueten Orten.

-- Myriſinites, kleinblätteriche Myrten Wolffs-Milch. Bey Seben und Gutenberg.

Falcata, Sichel-Kraut. An den Zäunen und Saat-Feldern.

-- latiote ſiliqua, Sichel-Kraut mit breiter Schote. In Gärten.

Ferrum equinum ſiliquis in ſummitate multiplicibns, gelbe Stein-Wicken. An den Schmoniſchen Bergen.

Foenum Græcum, Bocks-Horn. In Gärten Off. Herb. Sem.

Gallium

Gallium album, weiß Wall-Stroh. Auf den Wieſen.
-- luteum, gelb Wall-Stroh. ib. Off. Herb.
-- album minus ſeu paluſtre, an den Paſſendorffiſchen Graben.
Geniſta Tinctorum, Färber-Pfriemen. In der Heyde. Am Gimmeritziſchen Stein-Bruche. Off. Fl. Sem.
-- Hiſpanica, Spaniſche Pfriemen. In Gärten.
Gentiana rubra, Entzian. ib. Off. Rad.
Geranium batrachoides, Gratia Dei, blauer Wieſen-Storch-Schnabel. Auf den Wieſen.
Gladiolus minor, Victorialis rotunda, braun Schwertel. In der Heyde und mittel Holtze. Off. Rad.
Glaucium, Papaver corniculatum, gehörnter Mohn. In Gärten.
Glaux maritima, Schiel-Kraut. Milch-Kraut. An der Sultzke. Bey Kelme.
Gramen arundinaceum, groß Waſſer Riet-Graß. Auf feuchten Wieſen.
-- avenaceum montanum lanuginoſum, Haber-Graß. In den Petersbergiſchen Rocken-Holtze.
-- cyperoides miliaceum Galgant. An den Paſſendorffiſchen Graben.
-- cyperoides minus panicula ſparſa, auf der Wieſe bey Giebichenſtein.
-- -- majus panicula ſparſa, groß Cyper-Graß. An den Paſſendorffiſchen Graben.

 tremu-

-- tremulum maius, Zitter-Graß. In dem Rocken und Mittel-Holtze.

-- -- minus, klein Zitter-Graß. Auf den Wieſen.

-- hirſutum anguſtifolium majus. In dey Rocken- und Mittel-Holtze.

-- junceum folio articulato ſeu ſylvaticum, Binſen-Graß. In den Rocken- und Gutenbergiſchen Holtze.

-- - minus, klein hart Graß. Auf den Hügeln zu Giebichenſtein.

-- -- ſpicatum, Juncago, Binſen Graß. Auf der Wieſe an dem Weinberge zu Giebichenſtein

-- aquaticum ſpicatum rubrum; Waſſer-Graß. An der ſaltzigen See bey Erdeborn und an der Sultzke.

-- paluſtre aculeatum, Waſſer-Graß mit ſtehenden Aehren. Auf feuchten Wieſen.

-- loliaceum, Lulch. In den Paſſendorffiſchen Korn-Feldern.

-- hordeaceum, Gerſten-Twalch. An graſichten Hügeln und Wegen.

Halicacabus, Alkekengi, Jüden-Kirſchen. In den Weinbergen. Off. Herb. Fructus.

Helianthemum ſerpillifolium Chamæciſtus, kleine Ciſten-Rößlein. An den Schmeniſchen Bergen.

Helleborine anguſtifolia fl. albo, wild Nieß-Kraut. Auf den Wieſen zu Canón und Nietleben.

monta-

-- montana anguſtifolia purpuraſcens, In den Schmoniſchen Bergen.

-- -- latifolia purpurea Ib.

-- -- -- fl. albo ibid.

Herniaria, Millegrana, Bruch-Kraut. Harn-Kraut. Auf ſandigten Hügeln bey Giebichenſtein und Kröllwitz. Off. Herb.

Hieracium Pannonicum ſ. latifolium, Herba Coſtæ, Wollhabicht-Kraut. In dem Puſche zu Dölau und Ließkau.

-- montanum foliis aſperis, Berg-Habicht-Kraut. Bey Kröllwitz.

-- minus ramoſum foliis anguſtiſſimis. In der Heyde.

Hordeum, Gerſte. Auf den Feldern. Off. Sem.

-- polyſtichum vielreihichte Gerſte Ib.

Horminum Salviæ folio, wilde Salbey/ bey Kelme und Langenbogen an den Hügeln.

-- fl. luteo ſ. glutinoſum, } gelb / weiß/

-- æthiopicum ſ. Æthiopis } Scharlach-Kraut. In Gärten.

Hyoſcyamus, Bilſen-Kraut. An den Wegen und aufgeworffenen Gräben. Off. Herb. Sem. Rad.

Iaſminum latifolium inodorum, gelber Jaſmin ohne Geruch. In Gärten.

Imperatoria, Meiſter-Wurtzel. In den Breniſchen Holtze und in Gärten. Off. Rad.

Iva arthetica, Chamædrys multifido folio, Schlag-Kräutlein. Auff ungebaueten Aeckern bey Schraplau. Off. Herb.

Juncus lævis panicula non ſparsâ, Wieſen-Binſen. Auff der Wieſe bey Giebichenſtein.

-- aquaticus minor equiſeti capitulis. Auff feuchten Wieſen bey Seben.

Lampſana, Haſen-Kohl. In den Stadt-Graben und andern Orten.

Lapathum acutum plano folio, oxylapathum, Grind-Wurtzel. Auff den Korn-und Haber-Aeckern / auch auffgeworffenen Gräben. Off. Herb. Sem.

-- acutum criſpum, krauſe ſpitzige Mengel-Wurtz. An feuchten Orten. Off. Rad.

Lathyrus perennis latifolius, in den Lotherslebiſchen Holtze. In der Lucke.

-- ſiliqua hirſutâ, Platt-Erbſen mit rauhen Schoten. In Gärten.

-- -- lata flore albo -- -- -- fl. cœruleo, -- Tingitanus, -- foliis pinnatis,	Allerhand Sorten von Platt-Erbſen.

-- Moſchatus. Ibid.

Lentibularia, Im Zwinger am Ranſtädtiſchen Thore und in den Paſſendorffiſchen Teiche.

Levcanthemum Tanaceti folio, Bellis Tanaceti folio, wilder Rhein-Farren. In Seben und Gutenberg.

Leviſticum, Liebſtöckel. In Gärten. Offic. Herb. Rad.

Lilium

Lilium flore albo. } einfache und gefüllte
-- -- pleno } weiſſe Lilien. Ibid. Off. Flor. Rad.

Linaria, Flachs-Kraut. In den Stadt-Graben und andern Orten. Off. Herb. Flor.

Lithoſpermum majus, Meer-Hirſen. Zu Dölau / und im Mittel-Holtze. Off. Sem.

-- fl. cœruleo majore, in den Rocken-und Mittel-Holtze.

Lolium, Dort. Auff den Aeckern.

Lotus corniculata glabra minor, Vogel-Wicken. Auff den Rheinen der Aecker.

Lunaria botryitis, kleine Mond-Raute. An dem Petersberge und auff der trocknen Wieſe am Rietlebiſchen Puſche.

Luteola, Streich-Kraut. An den Straſſen bey Teiche / Bennſtedt.

Lychnis flore profunde laciniato, Flos cuculi, Fleiſch-Blumen. Auff den Wieſen.

-- ſylveſtris glabra noctiflora, wilde Margen-Rößlein. In den Sommer-Feldern bey Seben.

-- ſegetalis calice pentagono, Vaccaria, Küh-Kraut. Auff den Giebichenſteiniſchen Sommer-Feldern.

-- caliculis ſtriatis turgidis, wilde Himmel-Rößlein. In ſandigten und leimigten Feldern bey Seben und Gutenberg.

-- Saponaria, Saponaria, Seiffen-Kraut.

Bey Kröllwitz/ auff den Gottes-Acker. Off. Herb. Rad.

Martagon, Aſphodelus, Türckiſcher Bund. Gold-Wurtzel. Im Zorgs Rocken- und Mittel-Holtze. Off. Rad.

-- Fl. miniato, } In Gärten.
-- Fl. albo, }

Melampyrum comâ purpureâ, Küh-Weitzen. In den Korn-Feldern bey Seben und Gutenberg.

-- -- cœruleâ & albâ, Parietaria Lipſienſium, Tag und Nacht. Feüer-Kraut. Im Rocken- und Mittel-Holtze. Zu Seben.

-- luteum ſylvaticum, Wald-Hirſſe. In der Heyde.

-- criſtatum flore purpureo. Ibid.

Melo, Melonen. In Gärten. Off. Sem.

Millefolium, Schaaff-Garbe. Auff den Graſe-Rheinen und an Wegen. Off. Herb. Flor.

-- fl. rubro, rothe Schaaff-Garbe. Im Lieskauer Puſche.

Mollugo montana latifolia ramoſa, groß Berg-Stern Kraut. Groß Wald-Meiſter. In der Heyde und im Mittel-Holtze.

Moly, Moly, in Gärten.

Myrrhis tuberoſa eſculenta, Cicutaria bulboſa, Napen-Körſel. Zu Dölau / Seben und Gutenberg. In den Püſchen. Off. Rad. Sem.

Napel-

Napellus fl. luteo humilis
-- -- altior } Eiſenhütlein mit gelben Blumen. In Gärten.

Naſturtium hortenſe, Garten-Kreſſe. In Gärten. Off. Herb. Sem.

-- verrucoſum, Coronopus Ruelly, wilde Kreſe. Auff den Holtz-Platze an der Saale und an den Straſſen.

-- ſylveſtre oſyridis folio, klein Beſen-Kraut. Auff den Wänden und an dürren ſteinigten und ungebaueten Orten.

Nymphæa major alba, weiſſe See-Blume. In der Lache zwiſchen Beſen und Schkopa. Off. Herb. Fl. Rad.

-- lutea, gelbe See-Blume. In den Paſſendorffiſchen Teiche. Off. Herb. Fl. Rad.

-- minima, Ranæ morſus minor, kleine See-Blume. Ibid.

Ocymaſtrum fl. pleno, Ocymaſtrum mit gefüllter Blume. In Gärten.

Oenanthe, Filipendula aquatica, Waſſer-Filipendel. An den Paſſendorffiſchen Graben.

Onagra, Lyſimachia ſpecioſa, groſſer gelber Weydrich. In Gärten.

Onobrychis, Hahnen-Kopff. An den Straſſen und Hügeln bey Lißkau.

Orchis parvo flore rubro, Knaben-Kraut mit ſchönen rothen Blumen. Auff den Wieſen bey Seben und im Lotherslebiſchen Holtze.

Fl. mi-

-- fl. minore puniceo globoſa, zu Guten-Berg.

-- barbata fœtida, Bocks-Hödlein / Geil-Wurtzel. In dem Laub-Froſche in der Heyde.

-- myodes, ſeu flore muſcam referens, Fliegen-Blumen. In den Holtze bey Brena und zu Reideburg.

-- palmata ſpecioſiore thyrſo fol. maculato, zu Seben und in den Holtze bey Brena.

Orobanche, Sonnen-Wurtzel. In der Heyde. Im Mittel-Holtze.

-- fl. candido, weiſſe Sonnen-Wurtzel / bey Brena.

Ornithogalum ſpicatum fl. albo } Africa-
-- -- fl. viridi } niſche
Feld-Zwiebel. In Gärten.

Panicum ſativum, Aehren-Hirſe. Auff den Diemitzer Feldern.

Papaver rheas ſeu erraticum, Klapper-Roſen. In den Frucht-Aeckern. Off. Herb. Flores.

Pentaphyllum erectum foliis ſubtus incanis, groß fünff Finger-Kraut. Im Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio.

Perfoliata, Durchwachs. In den Saat-Feldern bey Nietleben. Off. Herb. Sem.

Phalangium ramoſum, groß Erd-Spinnen-Kraut. In der Heyde.

Phellandrium, Cicuta aquatica, Waſſer-Schierling. In dem Paſſendorffiſchen Gräben. Off. Herb. Sem.

Pilo-

Piloſella flammea, Saffrangelbe Maußöhrlein. In Gärten.
Piſum ſativum, Stabel-Erbſen. } Ibid.
-- ſiliquâ curvâ, Zucker-Erbſen. }
-- comoſum, Puſch-Erbſen. Off. Sem.
-- ſylveſtre perenne, wilde Erbſen. In den Schmoniſchen Bergen.
Podagraria, Angelica erratica, Geiß-Fuß/ Giers. In ſchattichten Püſchen.
Polygala fl. cœruleo rubro & albo, Creutz-Blümlein/ Milch-Kraut. In der Heyde.
Polygonum anguſtiſſimo & acuto folio minus, kleiner Wegetritt. In den ſandigten Feldern bey der Heyde und Kröllwitz.
Porrum capitatum, Porree. In Gärten. Off. Sem.
-- ſectile, Schnittlauch. Ibid.
Potamogetum ſalicis folio, Saam-Kraut/ Fontein-Kraut. In tieffen Pfützen bey Paſſendorff.
Pſyllium, Flöh-Kraut. In Gärten. Off. Sem.
Pulegium, Poley. Off. Herb.
-- anguſtifolium, Poley mit ſchmahlen Blättern. In Gärtern.
Pyrola rotundifolia, Winter-Grün. Im Nietlebiſchen und Petersbergiſchen Holtze. Off. Herb.
-- folio oblongo ſerrato. In der Heyde.
-- fruteſcens arbuti folio. In den Holtze bey Brenq.

Ranun-

Ranunculus aquaticus cotyledonis folio, Waſſer-Hahnen-Fuß mit genabelten Blättern. An dem Dölauiſchen Teiche.
-- paluſtris longifolius planus minor, lang-blätteriger Hahnen-Fuß. Zu Nietleben an den Gräben und am Dölauiſchen Teiche.
-- -- -- minor foliis ſerratis, Waſſer-Hahnen-Fuß mit gekerbten Blättern. Ibid.
-- montanus gramineo folio, Berg-Hahnen-Fuß mit groſen Blättern. In den Schmoniſchen Bergen.
Raphaniſtrum diſpermum, Heyde-Rettich. In den Korn-Aeckern und den Straſſen bey Kelme und Benſtedt.
Raphanus minor, Radiß. In Gärten.
-- major, Rettich. Off. Sem. Rad.
Rapunculus corniculatus ſcabioſæ capitulo, Schaaff-Räpuntzel. In der Heyde und auff den kleinen Hugeln daherumb.
Reſeda, Feld-Rancken. An den Wegen und Straſſen bey Kelme.
Roſa fl. luteo, gelbe Roſe. In Gärten.
-- Turcica, Türckiſche Roſe. Ibid.
-- Centifolia, Centifolien. Off. Fl.
-- Damaſcena, Damaſcener-Roſen. Ibid. Off. Flor.
-- fructu majore groſſe Haynbuten tragende Roſen. Ibid. & aliæ.
Rubeola arvenſis repens, in den Korn-Feldern bey Seben und Gutenberg.

Rubus fructu nigro, Brommbeeren. In den Hecken. Zu Nietleben. Off. Herb. Fructus.
-- repens fructu cœſio, Kratzbeeren. Auff ungebaueten Aeckern und in den Hecken.
Salvia latifolia, breitblätteriche Salbey.
-- anguſtifolia, ſchmalblätteriche Salbey. In Gärten. Off. Herb. Fl. Sem.
Scorzonera Germanica latifolia ſinuata, deutſche Scorzonera. In den Schmoniſchen Bergen.
-- Pannonica latifolia nervoſa, Ungariſche Scorzonera. In der Heyde in dem Laub-Froſche.
-- Hiſpanica, Spaniſche Scorzonera oder Schlangen-Mordt. Off. Rad.
Scrophularia radice fibroſa, Braun-Wurtzel mit Betonien-Blättern. In den feuchten Puſche vor Seben und Gutenberg.
Sedum teretifolium minimum, Mauer-Pfeffer. Auf alten Mauren und Stein-Felſen Off. Herb.
-- -- maius, klein Hauß-Wurtz Katzen Träublein. In der Heyde an bergichten Püſchen.
Senecio minor latiore folio, Berg-Creutz-Kraut. In der Heyde.
-- hirſutus, wollicht Creutz-Kraut. Im Gutenbergiſchen und Rocken-Holtze.
Serpillum citratum, wohlriechender Quendel. An ſandigten Hügeln Off. Herb.

ino-

-- inodorum hirſutum, Feld-Kümmel/Quendel ib.

Sinapi, Senff. In Gärten. Auch auf den Feldern. Off. Sem.

Siſymbrium aquaticum, Naſturtium aquaticum, Waſſer-Kreſſe. An den friſchrn Bächlein zu Nietleben und Seben.

-- aquaticum hirſutum, Brunnen-Kreſſe ib.

Solanum ſcandens, Dulcamara, Hinſch-Kraut. An der Saale hin und wieder. Off. Herb. Baccæ.

Sonchus lævis latifolius, Haſen-Kohl/ Gänſe-Diſtel. In den Kraut- und Küchen-Gärten. Off. Herb.

Sparganium ramoſum, Igels-Knoſpen. In den Paſſendorffiſchen Graben.

-- non ramoſum. Ibid.

Sphondylium, Branca urſina, Bären-Klau. Zu Seben. In der Lucke. Off. Herb.

Spiræa, Spiree. In Gärten.

Thalictrum flore luteo, Wieſen-Raute/mit gelben Blumen. In Gärten.

-- anguſtis foliis Rorimarino ſimilibus, In der Aue und bey Zweetſch.

Thlaſpi Machlinenſe incanum, grauer Bauer-Senff. In den Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio.

Tragopogon flore luteo, Bocks-Bart. Auff den Wieſen und Graſichten Hügeln.

-- fl. cœruleo, Haber-Wurtzel. In Gärten.

Trifo-

Trifolium pratenſe minus flore albo, weiſſer glatter Wieſen-Klee.
-- -- flore purpureo, rother Wieſen-Klee. Auf den Seebiſchen und Gutenbergiſchen Wieſen.
-- montanum flore carneo globoſo majore, In den Petersbergiſchen Mittel-Holtze.
-- ſpica oblonga ſubrotunda, groſſer Haſen-Klee. In den Rocken-und Mittel-Holtze.
-- ſpica longiſſima, groſſer Haſen-Klee. ib.
Triticum, Weitzen. Auf den Aeckern. Off. Sem.
Turritis, Braſſica ſylveſtris, wilder Kohl mit ſcharffen Blättern. Zu Gutenberg.
Vaccinia paluſtris, oxycoccus, Mooß-Beeren. Am Teiche bey Dölau.
Vicia annua major, ſiliqua ſubfuſca, wilde Wicken. In der Sommer-Saat.
-- -- lutea galea fuſca. In den Sommer-Feldern bey Diemitz.
Urtica urens major, groſſe Brenn-Neſſel. An ungebaueten Orten. Off. Herb. Rad. Sem.
-- -- minor, Eyter-Neſſel. Auf brachliegenden Feldern und in Kraut- und Küchen-Gärten. Off. Herb. Sem.
-- pilularis ſ. Romana } Römiſche Neſſel
-- -- parietariæ folio. } Off. Herb. Sem.

JULIUS.

Abſynthium, Wermuth. In Gärten. Off. Herb. Flores.
Acanthus mollis } Welſch Bären-Klau. In
-- ſpinoſus } Gärten.

Ægylops, ſeu feſtuca glumis hirſutis, Treff/ Twalch. An den Rheinen der feuchten Aecker.
-- Bromoides, feſtuca longiſſimis glumis, Haber-Twalch. In den Gerſten-und Haber-Feldern.
Ageratum, Eupatorium Meſue, Leber Balſam.
Agrimonia, Odermennige. An den Hügeln zu Seben und andern Orten. Off. Herb. Rad.
Alcea, Sigmars-Wurtzel. Im Mittel-Holtze und Dölauiſchen Puſche. Off. Rad.
Allium montanum, Wald-Knoblauch. In den Rocken-und Mittel-Holtze.
-- umbelliferum pratenſe, Wilder Brißlauch. Auf feuchten Wieſen.
Alſine ſcandens baccifera. In den feuchten Puſche vor Seben.
Althæa, *Bismalva*, Ibiſch-Kraut. Zu Paſſendorff / Püſchdorff an den Wegen und Zäunen. Off. Herb. Flor. Sem. Rad.
Anagallis flore cœruleo, blauer Gauchheil. Auf den Aeckern zu Nietleben und Seben. Off. Herb.
-- fl. miniato, rother Gauchheil. ib.
-- fl. perſico, bey Querfurth.
Aniſum, Aniß. In Gärten. Off. Herb. Sem.
Anonis, Ononis, fl. rubro, Hauhechel an ungebaueten Orten und auf den Straſſen Off. Rad.
-- fl. albo, bey Teiche und Seben.
-- non ſpincſa, zwiſchen Scherben und Nietleben an den Hügeln.

Alope-

-- Alopecuroides, Hechel-Kraut mit dicken Aehren. In Gärten.
Antirrhinum arvenſe minimum, klein Feld-Orandt. Auf den Diemitzer Kraut-Aeckern.
Apium paluſtre, Plaudapium, Waſſer-Eppich. An den Paſſendorffiſchen Graben und zu Benn-ſtedt. Off. Herb. Sem.
-- ſativum, Petroſelinum Peterſilge zu Die-mitz. Off. Herb. Sem. Rad.
-- latifolium, dulce, Sellery ib. und in Gär-ten. Off. Herb. Sem. Rad.
Artemiſia, Beyfuß. An den Garten-Zäunen zu Diemitz. Off. Herb. Rad.
Aſter maritimus, See-Stern-Kraut. An der Sultzke bey Kelme.
Atriplex alba, weiſe Melde. In den Möhren-u. Kraut-Aeckern bey Diemitz Off. Herb. Sem.
-- rubra, rothe Melde. ib. Off. Herb. Sem.
-- anguſtifolia laciniata, Scheiß-Melde. An ungebaueten Orten.
-- Marina, See-Melde. An der Sultzke bey Kelme.
-- ſylveſtris latifolia, Pes Anſerinus, Gän-ſe-Fuß/ Säu-Todt. An ungebaueten Orten um die Miſt-Hauffen.
-- fœtida, Vulvaria, ſtinckende Melde. An den Wänden.
Blitum annuum rubrum rectum, rother Meyer. In den Diemitzer Kraut-Gärten.

-- maritimum, klein Glaß-Kraut. An der Sultzke.

Botrys, Trauben-Kraut. In Gärten. Off Herb. Sem.

Bugloſſum Creticum, Cretiſche Ochſen-Zunge. In Gärten.

Bupleurum anguſtifolium, ſchmalblätteriche Haſen-Oehrlein. In der Heyde und zu Dölau.

-- latifolium, breitblätteriche Haſen-Oehrlein. ibid.

Calendula Africana fl. albo ſubtus violaceo major, Africaniſche Ringel-Blume. In Gärten.

-- -- minor ibid.

Campoides major, groſſer Raupen-Klee. In Gärten.

-- minor hiſpida, kleiner Raupen-Klee. ib.

Campanula glabra major lacteſcens flore albo & cœruleo, Mich-Glöcklein. In der Heyde/ Rocken- und Mittel-Holtze.

-- -- Perſicæ folio, Milch-Glöcklein mit Pfirſig-Blättern. In dem Mittel-Holtze.

-- rapunculi radice repente, wilde Milch-Glöcklein. Zu Diemitz.

-- flore conglomerato, klein Halß-Kraut. Auf den Wieſen und graſichten Hügeln.

Cannabina ſpuria, urticæ affinis, Acker-Neſſel. In den Stadt-Graben/ zu Diemitz. An den Hecken.

-- -- flore variegato, Zu Seben und Gutenberg.

Car-

Cardamindum, Naſturtium Indicum flore majore, Spaniſche Kreſſe. In Gärten.
-- fl. minore Spaniſche Kreſſe mit kleinen Blumen ib.
Cardiaca, Hertzgeſpan-Kraut. Zu Diemitz. Off. Herb.
Carduus arvenſis ſerpens lævicaulis, Acker-Diſtel/ Vieh-Diſtel. In den Korn- und Haber-Aeckern.
-- capite nutante, Cynara ſylveſtris, ſtechende Diſtel mit groſſen hangenden Blumen. An den Straſſen hin und wieder.
-- ſpinoſiſſimus anguſtifolius kleine Wege-Diſtel. An den Zäunen und Gräben.
-- lanceatus latifolius, Speer-Diſtel. An den Wegen und Straſſen.
-- tomentoſus latifolius Wege-Diſtel mit Purpurfarben Blumen. Auf dürren Orten/ Angern und Straſſen.
-- -- ſpinoſior caule alato, Onopordon, weiſe Wege-Diſtel An den Wänden / Wegen und Straſſen.
-- ſtellatus, ſolſtitionalis Stern-Diſtel. An ungebaueten Orten.
Carduus Mariæ, Marien-Diſtel / Stech-Körner. In Gärten. Off. Herb. Sem.
Carlina, Eber-Wurtzel. An dürren ſteinigten Hügeln bey Schraplau und Querfurth. Off. Rad.

Caryophyllus ſylveſtris plumarius, weiſe wilde Feder-Näglein. Im Lieſskauiſchen Puſche.
— ſylveſtris prolifer, kleine wilde Näglein. Auf dem Wege von Seben nach Gutenberg.
Cedronella, Meliſſa Turcica fl. albo } Türckiſche
— flore cœruleo } Meliſſe.
In den Gärten Off. Herb.
Centaurium minus, Tauſend gülden Kraut. Auf trocknen Wieſen zu Seben/ Nietleben hinter den Faſanen-Hauſe Off. Herb. Fl.
— puſillum; auf den Wieſen zu Canön und Kelme. Off. Herb. Fl.
Centumnodia Polygonum latifolium, groß Wegegraß. An den Wegen Off. Herb.
Cepæa, Welſch Harn-Kraut / Burtzel-Kraut. An der Sulzke und ſaltzigten See bey Erdeborn und Rulsdorff.
Cervaria nigra, ſchwartze Hirſch-Wurtzel. Zu Dölau und Seben.
Chamænerion ſpecioſum ſpicatum, groſſe Weydrich-Rößlein. In der Lucke und in den feuchten Puſche bey Dölau.
— majus glabrum, Weydrich-Rößlein. An den Waſſer-Bächen bey Seben und Nietleben.
— minus, Weydrich-Rößlein. ib.
— hirſutum flore minore, kleine Weydrich-Rößlein. ib.
Chamæpitys fl. luteo, Feld-Cypreß. Bey Kelme und Bennſtedt in den Weinbergen. Offic. Herb.

Cha-

Chamomilla Romana, Römiſche Camillen. In Gärten. Offic. Herb. Flor.
Cheiri minus ſylveſtre, gelbe Wald-Veilgen. An den Puſchichten Berge vor Seben.
Chryſanthemum vulgare, Gold-Blume/ hinter dem Gymnaſio. Auf den Feldern zu Dölau.
-- fl. luteo } ſimplici & pleno Gold-
-- fl. ochroleuco } Blume. In Gärten.
-- fl. albo ib.
Cicer album, weiſe Kichern. ibid. Off. Sem.
-- rubrum, rothe Kichern. ibid. Off. Sem.
Cichorium ſylveſtre, Wegewart. An den Straſſen und auf den Wieſen. Off. Herb. Sem. Rad.
Cinara, Artiſchocken. In den Diemitzer Kraut- und andern Gärten.
Ciſtus Ledon foliis Roriſmarini ferrugineis, Roſmarinus Bohemicus, Poſt/ Wantzen-Kraut. In den Pahendorffiſchen Holtze über Hönſtädt.
Cnicus, Carthamus, Safflor wilder Saffran. In Gärten und Kohl-Gärten. Off. Sem.
Coluthea veſicaria, Linſen-Baum. In Gärten.
Convolvulus major albus, groſſe Winde. In den Püſchen und Hecken.
-- fl. purpureo } blaue und rothe Win-
-- fl. laſuro minor } de. In Gärten.
Conyza media magno flore, Dürr-Wurtzel mit groſſen gelben Blumen bey Seben Canön.

-- flore vix radiato, kleine Dürr-Wurtzel. Auf dem Wege nach der Heyde und Seben.

Cracca Bengalenſis Vogel-Wicke aus Bengala In Gärten.

Cuſcuta major, Flachs-Seyde. Zu Seben/ Paſſendorff. In den Puſchen und Hecken. Off. Herb.

-- minor, kleine Flachs-Seyde. In der Heyde. Zu Seben an den graſichten Hügel. Off. Herb.

Cyanus Moſchatus fl. albo,
-- -- fl. luteo,
-- -- fl. rubro, } Bieſem-Knopff. In Gärten.

Delphinum fl. cœruleo,
--- fl. roſeo,
--- fl. albo,
--- fl. variegato, } ſimplici & pleno, Ritter-Sporn allerhand Sorten. Ibid.

Echium ſcorpioides paluſtre, vergiß mein nicht. An feuchten Orten hin und wieder.

Elychryſum, ſtoechas citrina, Rhein-Blumen, Katzen-Pfötgen. An den Wegen und Straſſen. Off. Flor.

Endivia, Endivien. In Gärten. Off. Herb. Sem Rad.

Equiſetum majus paluſtre, groß Waſſer-Schafftheu. In den Paſſendorffiſchen Grabē.

-- paluſtre minus, longioribus ſetis, klein Waſſer-Schafftheu. Auff feuchten Wieſen bey Seben.

-- ſylvaticum tenuiſſimis ſetis, Wald-Schafftheu. In den Petersbergiſchen Holtze.

Eruca

Eruca ſylveſtris latifolia folio integro, Myagro affinis, groſſe wilde Kreſſe. In den Saam-Feldern bey Teiche.
Eryngium vulgare, Manns-Treu. An den Straſſen. Off. Rad.
-- flore & caule cœruleo, blauer Manns-Treu. In Gärten.
Eſula minima, kleineſte Wolffs-Milch. In den Korn-Feldern.
-- Myrſinites ſeu anguſtifolia, Myrten-Wolffs-Milch. In den Diemitzer Gärten.
Euphraſia, Augen-Troſt. Auff den Wieſen zu Canon / Seben und auff graſichten Hügeln. Off. Herb.
-- lutea, odontites, gelber Augen-Troſt. Auff den Hügeln zu Giebichenſtein und Seben.
-- rubra, odontites rubra, brauner Augen-Troſt. Auff feuchten Wieſen hin und wieder.
Eupatorium cannabinum, Waſſer-Doſten. An den Sebiſchen und Rietlebiſchen Bächlein. Off. Herb. Rad.
Fagopyrum, Frumentum Saraceenicum, Buch-Weitze. Auff den Gutenbergiſchen Aeckern.
Falcaria, Crithmus, Sichel-Kraut. In den Korn-Aeckern und im Stadt-Graben.
Falcata vulgaris, Vogel-Pfote. Auff den Aeckern und Rheinen.
-- fl. purpureo, in Gärten.
Ficus, Feigenbaum. Ibid. Off. Fol. Fruct.

Fœniculum, Fenchel. In den Diemitzer Feldern, Off. Herb. Sem. Rad.
Fungus pileolo lato, lacteum dulcem ſuccum fundens, Brötlinge. In der Heyde.
-- albus acris lacteo ſucco turgens, Pfefferlinge. Ibid.
-- pileolo lato orbiculari flaveſcente, gelbe Pfefferlinge. Rehlinge. Ibid.
Galega fl. albo, } Geiß-Raute. In Gärten.
-- fl. cœruleo, } Off. Herb. Sem.
Gentianella cruciata, Modelgeer / Creutz-Wurtz. An den Schmoniſchen Bergen.
-- paluſtris anguſtifolia, Lungen-Blumen. Auff den Wieſen bey Canön und Lochau.
Geranium ſanguineum, Blut-Wurtzel. In bergichten Püſchen und Höltzern. Off. Rad.
-- triſte, breitblätterichter Storchſchnabel. In Gärten.
-- Alchimillæ folio, Storchſchnabel mit Sinnau-Blättern. Ibid.
Glaucium, Papaver ſpinoſum, ſtachlicht köpfichter Mohn. Ibid.
Glyciyrhiza ſiliquoſa, Süß-Holtz. Ib. Off. Rad.
Gnaphalium vulgare majus, groß Ruhr-Kraut. Auff ungebaueten Feldern.
-- -- minus repens, klein Ruhr-Kraut. Ib.
-- virgatum ſeu rectum, groß Aehricht Ruhr-Kraut. Auff dürren Hügeln bey Seben. In der Heyde.

Ame-

-- Americanum, Americaniſch Ruhr-Kraut. In Gärten.

Gramen nodoſum avenaceâ paniculâ, Knollen-Graß. Hin und wieder an ungebaueten Orten.

-- minus cyperino non abſimile, klein Ried-Graß. Auff der Giebichenſteiniſchen Wieſe.

-- avenaceum, Haber-Twalch unter der Sommer-Saat.

-- caninum repens officin. Quecken-Graß. Auff den Aeckern. In den Gärten. Off. Rad.

-- cyperoides paluſtre majus, triquetrum, wild Waſſer-Galgant. An den Paſſendorffiſchen Graben.

-- Phaleroides, wild Canarien-Graß. Bey Dölau / Lettin.

-- typhoides aſperum minus, Liſch-Graß. Bey Gutenberg und Seben.

-- -- ſpicâ anguſtiore Alopecurinum, klein Fuchs Schwantz-Graß. An den Hügeln bey Rulsdorff und Kelme

-- -- molle Alopecuroidi & Phaleroidi accedens folio lanuginoſo, Fuchs-Schwantz-Graß. An vielen Orten und an den Wegen und Straſſen.

-- cyperoides, Liſch-Graß. Auff feuchten Wieſen.

-- typhoides ſpicâ multiplici nigra, bey Seben und Gutenberg auff feuchten Wieſen.

ſylva-

-- ſylvaticum ſpicâ ruffeſcente molli, Wald-Graß. In der Heyde.

Granatus Balauſtium, Granat-Baum. In Gärten.

Grana Tilli, Flos Paſſionis, Paßions-Blume. Ibid.

Hedyſarum clypeatum, Schild-Kraut. Ibid.

Helenium, Aland. Auff den Diemitzer Kraut-Aeckern. Off. Fl. Rad.

Heracantha, Carlina ſylveſtris, Drau-Diſtel. In der Heyde auff ſandigten Hügeln.

Hieracium parvum hirſutum, caule aphyllo, bey Müllers-Dorff und Schochwitz.

-- arvenſe Chondrillæ foliis hirſutis, Habicht-Kraut. Auff den Felde bey Diemitz und Reideburg.

-- -- Chondrillæ foliis latioribus, minus profunde diſſectis, bey Diemitz und Giebichenſtein.

-- arvenſe caule aphyllo, foliis chondrillæ profunde diſſectis. Ibid.

-- Chondrillæ folio glabro profunde inciſo, radice ſuccisa, ſchwartz Habicht-Kraut. Auff den Wieſen bey Seben und Gutenberg.

-- arvenſe foliis Linariæ ſimilibus, bey Oppin und Brachſtedt.

-- -- magnum hirſutum foliis integris, bey Diemitz.

-- -- majus foliis valde aſperis laciniatis, bey Kröllwitz.

monta-

-- montanum foliis oblongis integris, Berg-Habicht-Kraut mit ungekerbten Blättern. Im Rocken- und Mittel-Holtze.

-- -- majus latifolium glabrum, groß Berg-Habicht-Kraut mit breiten Blättern. Ibid.

-- -- anguſtifolium Dentis Leonis folio incano, l. cichoraceo, Berg Habicht-Kraut mit Wegwart-Blättern. In der Heyde.

-- minus Dentis Leonis folio oblongo glabro, klein Fercklein-Kraut. Bey Seben/ Giebichenſtein.

-- montanum anguſtifolium rigidum, Berg-Habicht-Kraut mit ſchmahlen wenig gekerbten Blättern. In den Weinbergen bey Kelme und Rulsdorff.

-- -- foliis latioribus valde dentatis hirſutum, in der Heyde.

-- murorum folio piloſiſſimo, Pulmonaria Callica, Buch-Kohl. In den Stadt-Graben hinter dem Gymnaſio und im Zwinger.

-- murorum laciniatum folio anguſtiore minus piloſum, Buch-Kohl mit ſchmahlen Blättern.

Horminum ſpurium, unechter Scharlach. In Gärten.

Hypericum vulgare, Johannis-Kraut auff ungebaueten Orten und in Hecken. Off. Herb. Fl. Sem.

ſoliis

-- foliis latioribus atrovirentibus, Johannis-Kraut mit breiten dunckel-grünen Blättern. Bey Gutenberg.
-- minus erectum, klein Johannis-Kraut. Auff den Hügeln am Peters-Berge.
-- -- bifolium, Aſcyrum dictum, Hartheu. In dem Sebiſchen Puſche und bey Licskau.
Hyſſopus fl. cœruleo,
--- fl. albo, } Hyſſop. In Gärten.
--- fl. rubro, Off. Herb. Sem.
Jacea nigra capitata, Flocken-Blume. Auff den Wieſen.
-- -- major laciniata, groſſe braune Flocken-Blume.
-- ſtœbe major caliculis ſplendentibus, Flocken-Blume. Bey Seben / in der Heyde und im Rocken-Holtze.
-- -- caliculis non ſplendentibus Ibid.
Jacobæa, Jacobs-Kraut. An den Straſſen und auff den Rheinen.
-- Africana fl. purpureo, roth Jacobs-Kraut. In Gärten.
Jaſminum Catalonicum, Spaniſcher Jaſmin. Ibid.
-- fl. luteo, gelber Jaſmin. Ibid.
Jucca glorioſa, Jucca. Ibid.
Ketmia, Althæa arboreſcens, Arabiſcher Pappel-Baum. In Gärten.
Lactuca ſylveſtris odore viroſo, wilder Lattich. zu Seben an den Puſchichten Hügel.

ſylve-

-- ſylveſtris coſta ſpinoſa, Gänſe-Zunge/ Leber-Diſtel. An ungebaueten Orten.

Lagopus, Katzen-Klee. In den Korn-Feldern.

Lappa, *Bardana* groſſe Klette. An den Wänden und Hecken Off. Herb. Rad. Sem.

Lapathum aquaticum, Hydrolapathum majus, Waſſer-Ampffer / Rocken-Blätter. In den Paſſendorffiſchen Graben. Off. Herb. Rad. Sem.

-- -- minus, kleiner Waſſer-Ampffer. An den Teichen und ſtehenden Waſſern.

-- acutum minimum, kleine Grind-Wurtzel An ſumpfichten Orten bey Paſſendorff/ Seeben.

-- unctuoſum, Bonus Henricus, guter Heinrich / Schmerbel. Auf ungebaueten Orten an den Dörffern.

Lathyrus ſylveſtris major fl. rubente, & albido minor, wilde Kichern. In den Holtze bey Brena.

Lavendula, Lavendel. In den Diemitzer Kraut- und andern Gärten. Off. Flor. Herb.

-- laciniato folio, Lavendel mit gekerbten Blättern. In Gärten.

Liguſtrum, Rhein Weyden. An den Hecken und Puſchen hin und wieder. Off. Herb. Baccæ.

Linaria annua coerulea minor, klein Flachß-Kraut mit blaulichen Blumen. In den Kraut- und Möhren-Aeckern.

minima

-- minima Africana Fl. coeruleo, klein Lein-kraut. In Gärten.

Locuſta, Valeriana, ſerotina, ſpäter Lämmer-Lattich: In den Aeckern bey Diemitz und Gutenberg.

Lotus officinarum fl. coeruleo, urbana, Sieben-Zeit. Zu Diemitz. Off. Herb.

Lupinus Fl. luteo
-- Fl. albo
-- rubro
-- Fl. coeruleo
majore & minore
Off. Sem.
} Allerhand Arten von Lupinen oder Feigbohnen. In Gärten.

Lupulus, Hopffe. In den Zäunen und Hecken, zu Paſſendorff. Off. Herb. Flor. Fol. Rad.

Lychnis Chalcedonica Fl. ſimplici
-- Fl. pleno.
} Zinnober-Blume. In Gärten.

-- Coronaria Fl. ſimpl. rubro
-- albo
-- variegato
-- Fl. pleno rubro
} Sammet-Blume. Ibid.

-- viſcaria latifolia, ſeu Luſitanica, breite Kleb-Lychnis. Ibid.

Lycopodium, Muſcus terreſtris clavatus, Gürtel-Kraut. Katzen Leiterlein Im Nietlebiſchen Puſche. Im Zorgs. off. Herb. Sem.

Lyſimachia lutea, gelber Weydrich. Bey Paſſendorff und an Puſchichten Ufern an der Saale.

-- Vir-

-- Virginiana, Virginianiſcher Weydrich. In Gärten.

Majorana, Majoran. Ibid.

-- hyemalis rotundifolia, Winter-Majoran. off. Herb. Sem.

Malva erecta, aufrechtſtehende Käſe-Pappel. In den Puſche zu Seben und Dölau.

-- procumbens Fl. majore } Gänſe-
-- Fl. minore }
Pappel. An ungebaueten Orten und an Gräben. Off. Herb. Flor. Sem. Rad.

-- Boetica, frembde Pappel. In Gärten.

-- foliis criſpis, Pappeln mit krauſen Blättern. Ibid.

-- roſea, Pappel-Roſen fl. ſimplici & pleno variique coloris. Ibid.

-- arboreſcens, ſtaudichte Pappel. Ibid Off. Herb.

Marum, Amber-Kraut. Ibid.

Marrubium album, weiſſer Andorn. An den Wegen an den Dörffern. Off. Herb.

-- nigrum, ſchwartzer Andorn. Ibid.

-- paluſtre glabrum, Waſſer-Andorn. An dem Dölauiſchen Teiche.

-- -- hirſutum tenuius laciniatum, In dem Waſſer-Graben bey Seben.

Matricaria, Mertram/Merterey. In den Gärten. Off. Herb. Flores.

-- Fl. pleno } Ibid.
-- Fl. fiſtuloſo }

Melilotus Fl. luteo, gelber Stein-Klee. In den Korn-Feldern und an den Ufern der Saale. Off. Herb Flor.

-- Fl. albo, weiſſer Stein-Klee. Ibid.

Meliſſa, Meliſſe. In den Gärten und zu Diemitz. Off. Herb. Sem.

Mentha ſylveſtris rotundiore folio wilde Müntze. Bey Püſchdorff und Reideburg.

-- -- Folio longiore ſpicata, Roß-Müntze. Auf den Wieſen bey Seben.

-- paluſtris, Bach-Müntze. An den friſchen Bächen bey Gutenberg und Seben. Off. Herb.

-- -- Folio oblongo hirſuta ſpicâ latiore, wilde Waſſer-Müntze. In dem Paſſendorfſiſchen Graben.

-- Folio acuto, Spitz-Müntze. In Gärten.

-- criſpa, Krauſſe Müntze ibid. Off. Herb.

Millefolium nobile, ſtratiotes Edelgarbe. Bey Gutenberg.

Moluccana, Meliſſa Moluccana, Moluccaniſche Meliſſe. ibid.

Momordica, Balſam-Aepffel. In Gärten. Off. Fructus.

Myrthus anguſtifolia, ſchmahlblätterichter Myrthenbaum. iqid.

-- latifolia, breitblätterichter Myrten-Baum. ibid. Off. Fol.

Nepetha Katzen-Müntze. ibid. Off. Herb.

Nigella latifolia, Schwartz-Kümmel. In den Diemitzer Aeckern. Off. Herb. Sem.

tenui-

-- tenuifolia fl. ſimplici. ib.
-- -- fl. pleno. In Gärten.
Nummularia, Egel-Kraut Pfennig-Kraut/ An den Ufern der Saale und andern friſchen Bächen. Off. Herb.
Ocimum flore albo } Baſilicum Baſilien-Kraut.
-- fl. bruno } In Gärten. Off. Herb.
-- minus } Sem.
Olsnitium, Oelßnitz-Wurtzel. In den feuchten Puſche bey Seben und Rietleben. Off. Rad.
Opuntia major } Ficus Indica, Indianiſch Fei-
-- minor } gen-Blat. In Gärten.
Oreoſelinum, Berg-Peterlein. In der Heyde und im Mittel-Holtze.
Origanum ſylveſtre, gemeiner Doſten. In der Heyde und im Mittel-Holtze. Off. Herb.
-- creticum, Cretiſcher Doſten. In Gärten Off. Herb.
Panicum ſylveſtre, Fench-Graß. Bey Diemitz.
-- -- panicula divulſa, ib.
Paſtinaca ſylveſtris, wilder Paſtinac. Auf den Wieſen.
-- ſativa, Paſtinac. Zu Diemitz. Off. Rad. Sem.
Pentaphyllum repens majus, groß Fünff-Finger-Kraut. In den Stadt-Graben und an den Rheinen. Off. Herb. Rad.
-- fragariæ folio, groß Staudicht Fünff-Finger-Kraut. In den Gärten.
Perſicaria acris, Hydropiper, Flöh-Kraut/

Waſſer-Pfeffer. An den Paſſendorffiſchen Graben und andern feuchten ſandigten Orten. Off. Herb.

— mitis major maculata, Flöh-Kraut. An der Saale. Off. Herb.

— mitis minor, klein Flöh-Kraut. In den Diemitzer Feldern.

Periclymenum Virginianum, Virginianiſcher Je länger je lieber. In Gärten.

Peucedanum, Haarſtrang/ Schwefel-Wurtz. In dem Mittel-Holtze und auf den Wieſen bey Skopa. Off. Rad.

Phaſeolus fl. albo, Schminckbohnen. In Gärten. Off. Sem.

— fl. rubro, Türckiſche Bohnen ibid.

Pimpinella alba major, groſſe Bibenell. Auf den Wieſen zu Paſſendorff/Seben. Off. Herb. Sem. Rad.

— — minor foliis criſpis, kleine krauſe Bibenell. An den Hügeln zu Giebichenſtein und Petersberg.

Porrum ſylveſtre, wilder Lauch. In der Heyde uud Mittel-Holtze.

Portulaca anguſtifolia ſylveſtris, Sauburtzel. Acker-Burtzel. In den Kraut- und Küchen-Gärten.

Potamogeton rotundifolium, Fontein-Kraut. Saam-Kraut. In den Teichen und Paſſendorffiſchen Graben.

— foliis ſplendentibus. ibid.

Ptar-

Ptarmica vulgaris, wilder Pertram. Auf den Paſſendorffiſchen Wieſen Off. Herb.
-- fl. pleno. In Gärten.
Pyrethrum, Pertram. ibid. Off. *Rad.*
Ranæ morſus, plantago aquatica, groſſer Waſſer-Wegerich. In den Waſſer-Gräben hin und wieder Off. Herb.
Ranunculus paluſtris longifolius minor foliis ſerratis, Waſſer-Hahnen-Fuß mit langen gekerbten Blättern. An der tieffen Lache bey Skopa und in der Lucke.
-- longifolius major, Waſſer-Hahnen-Fuß mit langen Blättern. ibid.
Sagitta major, groß-Pfeil-Kraut. In den Paſſendorffiſchen Graben.
-- minor anguſtifolia ibid.
Salicaria, Lyſimachia ſpicata purpurea, brauner Weydrich. An den Ufern der Saale.
Santolina folio virdi, Cupreſſus fœmina, Cypreſſen-Kraut. In Gärten.
-- folio incano. Ibid.
Saponaria fl. pleno, Seiffen-Kraut. In Gärten.
Satureja Saturey/ Pfeffer-Kraut. Ibid. Off. Herb. Sem.
Scabioſa, tenuifolia flore ochroleuco, weiſe Scabioſe. An den Hügeln zu Giebichenſtein und andern Orten.
-- -- flore cœruleo, kleine blaue Scabioſe. In der Heyde,

— præmorſa radice, Succiſa Morſus Diaboli, Teuffels Abbiß. In dem Puſche zu Nietleben. In der Heyde Off. Herb. Rad.

Scordium, Lachen-Knoblauch. In der Lucke und an den Paſſendorffiſchen Graben. Off. Herb.

Scutellaria, Tertianaria, Fieber-Kraut. In der Lucke und Paſſendorffiſchen Graben.

Sedum maius, Sempervivum, Hauß-Laub. Auf den Wänden an den Dörffern. Off. Herb.

— teretifolium flore albo, Mauer-Pfeffer mit weiſer Blume. In Gärten.

Serratula, Scharten-Kraut. Auf den Wieſen und andern graſichten Orten.

Seſeli pratenſe, Roß-Fenchel. Auf feuchten Wieſen.

Sideritis hirſuta procumbens, Herba Iudaica. An den Puſchichten Hügeln bey Seben. Off. Herb.

Siler, Libanotis Theophraſti, weiſer Entzian. Im Lieskauiſchen Puſche und im Mittel-Holtze. Off. Sem.

Solanum vulgare, Nachtſchatten. In den Diemitzer Kraut-Gärten. Off. Herb. Baccæ.

Sonchus aſper laciniato folio, Sau-Diſtel. An den Wegen und ungebaueten Orten.

— lævis, groſſe Gänſe-Diſtel. In den Saamen-Feldern bey Diemitz.

Spica, Lavendula ſpicata, Spicke zu Diemitz.

Stachys

Stachys montana, riechender Andorn. An den Weinbergen an der Saale.
- paluſtris, Waſſer-Andorn. An feuchten Orten hin und wieder.
Stoechas Arabica, Arabiſche Stoechas-Blumen. In Gärten. Off. Flores.
Staphylinus ſativus, Daucus noſtras Möhren. Auff den Feldern. Off, Sem.
- ſylveſtris, Daucus ſylveſtris, Vogel-Neſt. Zu Seben und Kelme.
Tagetes, Flos Africanus major) Studenten-
- flore ſimplici } Blume. In
- fl. tubulato } Gärten.
- fl. pleno)
- minor, kleine Sammet-Blume. ibid.
Tanacetum, Rhein Farren. Auf den Wieſen Off. Herb. Flor. Sem.
Thalictrum majus, ſ. Pœoniæ folio, groſſe Wieſen-Raute. In der Lucke. Auf den Paſſendorffiſchen Wieſen.
- minus montanum, Berg-Raute. In der Heyde. Off. Herb.
Tilia mas, ulmifolia, Wald-Linde/ Stein-Linde. In den Schmoniſchen und Petersbergiſchen Holtze. Off. Herb. Flor. Viſcus, Cortex interior.
- fœmina folio majore, platiphyllos, Linden-Baum. In Lotherslebiſchen Holtze it.
Tragopogon gramineo folio, kleiner Morgenſtern. In den Lotherslebiſchen Holtze auf den Wieſen.

 tenui

– tenuifolium, coronopi folio, kleiner Bocks-Bart. An den Gräben und Straſſen.
Trifolium bituminoſum, Hartz-Klee. In Gärten.
Veratrum, Helleborus albus, weiſe Nieß-Wurtzel. In Gärten. Off. Rad.
Verbaſcum nigrum ſ. fœmina flore minore, gelb Wull-Kraut. Auf den Hügeln bey Giebichenſtein.
– latifolium ſ. mas, Königs-Kertze. Wull-Kraut. ibid. Off. Herb. Flores.
Verbena, Eiſenhart. An trocknen ſandigten Orten bey Diemitz. Off. Herb. Rad.
– urticæ folio, Eiſenhart mit Neſſel-Blättern. In Gärten.
Veronica ſpicata minor, kleiner aufrechtſtehender Ehren-Preiß. In der Heyde.
– – recta major, groſſer aufrechtſtehender Ehren-Preiß. ibid. In Rocken und Mittel-Holtze.
Veſicaria, Cor Indum, Piſum cordatum, Hertz-Saamen. In Gärten.
Virga aurea Geſneri, Conſolida Saracenica, Heydniſch Wund-Kraut. Off. Herb. Flores.
– – Linariæ folio, gülden Lein-Kraut. In der Heyde/ zu Seben.
– latifolia ſerrata, breitblättrich Wund-Kraut. In den Schmoniſchen Bergen.
– major, Doria, groß gülden Wund-Kraut. In den Paſſendorffiſchen Graben und in der Lache bey Skopa. ff, mi-

-- -- fl. minore, klein Heydniſch Wund-Kraut. In Gärten.
-- -- Limonii folio. Ibid.
Vitex, Agnus caſtus, Keuſch Lamm. Ibid. Off. Fol. Sem.
Vitis, Wein-Stock. In den Weinbergen und Gärten.
Ulmaria, Geiß-Bart. Auf feuchten Wieſen. Off. Rad.
Utrinque ſerrata, Säge-Kraut. In Gärten.
Xanthium, Lappa minor, kleine Kletten/Bettlers Läuſe. Vor dem Neumärckiſchen Thore an der Leim-Grube.

AUGUSTUS.

Abrotanum campeſtre, wilde Stabwurtz. An den Hügeln zu Seben und andern Orten.
Abſynthium Ponticum tenuifolium, Pontiſcher Wermuth. In der Heyde und zu Dölau. Off. Herb. Flor.
Acinos, Stein-Poley. Auf den Aeckern nach der Erndte. In der Heyde
Adianthum nigrum, Frauen-Haar. An den Stein-Felſen zu Giebichenſtein. Off. Herb.
Ajujah, Polium montanum, klein Berg-Poley. Bey Kelme an den Bergen.
Alſine hirſuta, Hüner-Darm mit haarichten Blättern. Auf graſichten Orten.

Amaranthus ſpicatus
-- criſtatus
-- caudatus
-- caule & ſemine nigro
-- tricolor
} Allerhand Sorten von Amaranth / Fuchsſchwantz In Gärten.

Angelica aquatica, Waſſer-Angelick. In den Paſſendorffiſchen Graben.

-- ſylveſtris, wilde Angelick. Auf den Wieſen bey Seben und Gutenberg.

Anguriæ, Citrullus, Citrullen in Gärten. Off. Sem.

Aquifolium, Stech-Palmen. Ibid.

Arundo vulgaris, gemein Rohr. An der Saale und in Teiche.

After Atticus vulgaris, blau Stern-Kraut. An den Hügeln bey Kelme und Bennſtedt.

Attractylis, Baſtard-Saffran. In Gärten.

Balſamina, Balſam-Kraut/ fl. albo, fl. rubro, fl. perſico. Ibid.

Canna Jndica, Jndianiſch Rohr. Ibid.

Capſicum, Piper Jndicum, Jndianiſcher Pfeffer Ibid. Off. Fruſt.

Carduus pratenſis latifolius, Wieſen-Kohl. Auf feuchten Wieſen bey Seben und Canon.

Clematis urens, Lienen hinter dem Gymnaſio im Stadt-Graben.

Coluthea æthiopica, æthiopiſcher Linſen-Baum. In Gärten.

Crocus Autumnalis officin. Saffran. In Gärten. Off. ſtamina florum.
Crupina Belgarum, Crupine. Ibid.
Cucumis Aſininus, Spring Gorcken. In Gärten.
Cucurbita, Kürbiß. Ibid. Off. Sem.
-- lagenaria, Flaſchen-Kürbiß.
-- pyriformis, Birn-Kürbiß.
-- coronata, Cronen-Kürbiß. Ibid.
Elatine, Linaria repens folio ſubrotundo, In den Diemitzer und Püſchdorffer Aeckern.
Filix non ramoſa major dentata ſ. mas, Farren-Kraut, In der Heyde. Off. Herb. Rad.
-- glabra mari accedens. In dem Gebiſchen Puſche.
-- corniculata, Schlangen-Zwang. An den Stein-Felſen zu Giebichenſtein und Kröllwitz.
-- petiolis tenuiſſimis, bey Giebichenſtein am Galgen-Berge.
-- petræa foliis non ſerratis, klein Stein-Farren. An den Stein-Felſen zu Giebichenſtein.
-- ramoſa major ſ. foemina, Farren-Kraut weiblein. In der Heyde. Off. Herb. Rad.
-- minor dentata, klein Stein-Farren Kraut weiblein. In einer Stein-Klufft an dem Galgen-Berge.
-- Rhætica tenuiſſimè dentata, In der Heyde und zu Nietleben.

Flos

Flos Solis major fl. ſimplici } Sonnen-Blume.
fl. pleno } Ibid.

Gentianella anguſtifolia minor, floribus ad latera piloſis, blauer Herbſt-Stengel. Auf den Wieſen zu Canon. zu Kelme.

-- brevi folio, minima, kleiner Himmelſtengel. An den Petersberge.

-- Alpina centaurii minoris foliis, kleiner blauer Himmel-Stengel. Ibid.

Gramen Iſchæmum, Blut-Graß. Auf den Hügeln bey dem Zorgs und der Heyde.

Hieracium minus, dentis Leonis folio ſubrotundo, klein Fercklein-Kraut. Auf dem Felde nach der Erndte an der Heyde.

Juncago, gramen junceum ſpicatum, Kröten-Graß. Auf feuchten Wieſen.

Kali geniculatum, Glaß-Kraut/ Grappe. An der Sultzke zu Kelme.

Ladanum ſegetum flore rubro & albo, Sideritis annua, Korn-Wiet. Alyſſen-Kraut. Auf den Hügeln bey Giebichenſtein,

Lichen petræus latifolius, Pulmonaria, Groß Stein-Leber-Kraut. An den Stein-Felſen bey Kröllwitz. Off. Herb.

-- fontanus/ Brunnen-Flechten. Off. Herb.

-- petræus ſtellatus, Stein-Flechten/ Mooß-Flechten. An den Giebichenſteiniſchen und Kröllwitziſchen Felſen.

-- arborum, Pulmonaria arborum, Lungen-Mooß. An alten Eichbäumen im Lotherslebiſchen Holtze. Off. Herb. Lenti-

Lenticula, Lens paluſtris, Meer-Linſen. In den Stadt-Graben.
Mentha arvenſis, Acker-Müntze. Auf den Brach-liegenden Feldern.
Muraria, Ruta Muraria, Mauer-Raute. An den Pfeilern an der Schul-Kirche und im Zwinger am Moritz-Thore. Off. Herb.
Napellus, Eiſen Hütlein. Im Mittel- und Lo-therslebiſchen Holtze.
Nerium, Oleander, Oleander. In Gärten.
Nicotiana major acutifolia, Toback auf den Aeckern. Off. Herb. Sem.
-- rotundifolia, rundtblätterichter Toback. In Gärten.
Nigella arvenſis, wilder Schwartz-Kümmel. In den Saam-Feldern nach der Erndte.
Parnaſſia, gramen Parnaſſi, weiſſe Leber-Blume. Auf den feuchten Wieſen zu Canön und Seben.
Perchepier Anglicanum, Alchimilla annua, Engliſcher Stein-Brech. Auf ſandigten Aeckern vor dem Neumärckiſchen Thore.
Polypodium, Engelſüß. An den Stein-Felſen bey Giebichenſtein und Kröllwitz. Off. Herb. Rad.
Portulaca, Portulac. In Gärten.
Rorella, Ros ſolis, Sonnen-Thau. An dem Teiche bey Dölau. Off. Herb.
Rubia Tinctorum, Farber-Röthe. In Gärten. Off. Rad.

Sangui

Sanguiſorba major, Bluts-Tropffen. Auf den Wieſen bey der Stein-Mühle / Gimmeritz / Paſſendorff: Off. Rad.

Seſamum, Lein-Dotter. Auf den Felde. Off. Sem.

Sium aquaticum latifolium, Waſſer-Peterlein. An den Paſſendorffiſchen Graben.

-- -- minus criſpis foliis, Brunnen-Peterlein. Ibid.

Telephium, Craſſula, Fette Henne. Zu Kröllwitz und Giebichenſtein an den Felſen. Off. Herb.

Thlaſpidium Creticum Fl. albo / Fl. purp. } Cretiſcher Bauer-Senff. In Gärten. Off, Sem.

Typha paluſtris, Liſchkolben. In den Stadt-Graben und an den Teiche zu Seben.

SEPTEMBER.

Althaea Ricini folio, Ibiſch-Kraut mit Wunder-Baum-Blättern. In Gärten.

Aſter Atticus Fl. cœruleo / -- -- Fl. albo } Stern-Kraut. Ibid.

Bidens, cannabina aquatica, Bettlersläuſe. An ſumpffigten Orten.

-- fl. radiato. Ibid.

Colchicum, Zeitloſen. Auf der Wieſe an der Pulver-Mühle.

Cycla-

Cyclamen, Schweine-Brodt. In Gärten. Off. Rad.

Fungus Sambucinus, Auricula Judæ, Holunder-Schwamm. An alten Holunder-Bäumen. Off. Fungus.

Mirabilis, Peruviana fl. luteo
-- -- fl. albo
-- -- fl. rubro
-- -- fl. variegat } Schweitzer-Hoſen. In Gärten.

Muſcus terreſtris abietis facie, kleiner Tannen-förmiger Mooß. In der Heyde.

-- denticulatus major, Erd-Mooß. Ibid. Off. Herb,

-- filicinus, Farren-Mooß. An alten verfaulten Stämmen zu Seben und in der Heyde.

-- arboreus, villoſus, uſnea officin. Baum-Mooß. An alten Bäumen. Off. Herb.

-- tubulatus, pyxidatus. An den Stein-Felſen zu Giebichenſtein und in der Heyde.

Orchis ſpiralis, klein gewunden Knaben-Kraut. An den Hügeln bey Querfurt.

Ricinus, Wunder-Baum. In Gärten.

Staphiſagria, Läuſe Kraut. Ibid. Off. Sem.

ERRA-

ERRATA CORRIGENDA.

P.1. Tit. lin. 3. lege præmiſſis. p. 2. lin. penult. leg. conſveverunt. p. 6. lin. 13. leg. inſignienda. p. 7. lin. 20. leg. conſpirant. p. 11. l. 13. leg. Angelica. p. 14. lin. 26. leg. ratione p. 15. l. 23. leg. ut. p. 16. l. 22. leg. planta. p. 24. l. penult. leg. groſſe weiſſe. p. 26. l. 2. deleatur fl. pleno. p. 33. l. 16. leg. muſcoſo. p. 46. l. ult. leg. Einblat. p. 52. l. 25. leg. latiore. p. 64. l. 6. leg. friſchen. p. 67. l. 5. leg. Paludapium p. 73. l. 22. leg. Saracenicum.